展望論文

項目反応理論モデルのパラメタ推定法の展開 Psychometrika 誌を中心として

山口 一大¹

¹ 筑波大学

要約

本稿では、項目反応理論モデルのパラメタ推定法について、Psychometrika 誌に発表された論文を主たる対象として、最近の展開を概観した。その結果、項目因子分析モデルや多次元因子分析モデルといった、因子数が多い状況で生じる計算量の困難に対処する様々な方法が提案されていた。具体的には、モンテカルロ積分法や、周辺尤度の近似の積極的な利用、最適化計算の工夫および機械学習領域で用いられている方法の導入が見られた。また、理論的な拡張として、サンプルサイズ・項目数を無限大にするという新しい漸近的状况が考察されていた。さらに、最尤推定・ベイズ推定の枠にはとどまらない方法の提案もなされていた。個人の潜在特性パラメタの推定に関しても、高い精度の信頼区間を保証する理論的な方法が提案されていた。

キーワード：項目反応理論モデル，多次元項目反応理論モデル，項目因子分析，パラメタ推定法

Review of recent developments of parameter estimation methods in item response theory models with focus on studies reported in Psychometrika

Kazuhiro Yamaguchi¹

¹University of Tsukuba

Abstract

This research reviewed articles that developed parameter estimation methods in item response theory models, with special focus on recent articles published mainly in Psychometrika. As a result, various new methods to manage the computational burden problem with respect to the item factor analysis and multidimensional item response models, which have high dimensional factors, were introduced. Monte Carlo integral methods, approximation methods for marginal likelihood, new optimization methods, and techniques used in the machine learning field were employed for the estimation methods. Theoretically, a new type of asymptotical setting, that assumes infinite number of sample sizes and items, was considered. Several methods were classified apart from the maximum likelihood method or Bayesian method. Theoretical development of interval estimation methods for a latent trait parameter were also proposed and they provided highly accurate confidence intervals.

Keywords: item response theory model, multidimensional item response theory model, item factor analysis, parameter estimation method

1. 問題と目的

項目反応理論モデル (item response theory models; IRT models; e.g., Embretson & Reise, 2000) は, Lord and Novick (1968)以降, もっとも活発に研究されている教育測定学的モデルである。モデルの拡張も活発に行われており, おびただしい量のモデルがこれまでに開発されてきている (e.g., van der Linden & Hambleton, 1997; van der Linden, 2016)。また, IRT モデルは, 学術研究のみならず, ハイスターク スなテストを支える理論的に重要な基盤として確固たる地位を築いている。

IRT モデルの項目パラメタの推定法といえば, Birnbaum (1968)の同時最尤推定法 (joint maximum likelihood estimation; JMLE) に始まり, Bock and Lieberman (1970)の周辺最尤推定法 (marginal maximum likelihood estimation; MMLE) を経て Bock and Aitkin (1981)の Expectation-Maximization (EM; Dempster, Laird, & Rubin, 1977)アルゴリズムを用いた MMLE が提案されており, Bock and Aitkin (1981)の MMLE が IRT モデルの標準的な推定法として定着していると考えられる。さらに, 事前分布を用いた事後確率最大化推定法 (maximum-a-posteriori estimation; MAP estimation) もよく利用される方法として紹介されている。IRT モデルの推定法についてまとめた Baker and Kim (2004) では, ベイズ的な推定法として, マルコフ連鎖モンテカルロ法 (Markov chain Monte Carlo method; MCMC method; Brooks, Gelman, Jones, & Meng, 2011) を用いた推定法についても紹介されている。Rasch モデルにおいては特殊な推定法である条件付き最尤推定法 (conditional maximum likelihood estimation) が利用でき, 独自の理論的な発展がみられる。日本語のテキスト (e.g., 加藤・山田・川端, 2014; 村木, 2011; 芝, 1991; 豊田, 2005) では, 標準的な EM アルゴリズムを用いた方法や Baker and Kim (2004)で紹介されている方法を中心として紹介している。IRT モデルのパラメタ推定法を行うためのソフトとして有名な BILOG-MG (Zimowski, Muraki, Mislevy, & Bock, 1996) においても, 項目パラメタの推定には MMLE が利用され, 潜在特性パラメタの推定には, Embretson and Reise (2000) で説明があるような通常の最尤推定法 (maximum likelihood estimation; MLE), 期待事後推定 (expected-a-posteriori estimation; EAP estimation) や MAP 推定が利用される。

このように, IRT モデルにおけるパラメタ推定法は MMLE を中心とし, ベイズ的な方法としては, MAP 推定や MCMC 法を使うことが標準的であり, すでにほとんど研究すべきことがないような印象がある。しかしながら, そうした所感とは裏腹に, 近年においても新しい IRT モデルのパラメタ推定法が活発に開発されている。そこで本研究は, (a) Psychometrika 誌を中心として, 2010 年 (75 巻 1 号) から 2021 年 (86 巻 3 号) の間に発表された論文および関連する論文をレビューし, IRT モデルのパラメタ推定法の最前線の研究動向を調査すること, また, (b) 本邦において知られていない IRT モデルのパラメタ推定法を概観することにより, 研究者・実務家の双方に IRT モデルの新しい研究観点と実用の方向性を提供すること, という 2 点を目的とする。本研究で主にレビューの対象とする Psychometrika 誌は, 計量心理学のトップジャーナルであり, 質が高く理論的に重要な文献が掲載されている。しかし, Psychometrika 誌に掲載されている論文は数学的に高度な内容を扱っているため, その内容を理解することは容易ではない。そこで, こうした先進的な推定法の展開について, それぞれの方法の理論的な背景と具体的なアルゴリズムを理解しやすい形にまとめることにより, 他誌で発表されている関連手法を把握することに役立ち, 日本のテスト学研究の発展に寄与できると考えられる。また, IRT モデル新しいパラメタ推定法が比較的多く発表されていると考えられる有名な計量心理学の雑誌として「British Journal of Mathematical and Statistical Psychology」, 「Multivariate Behavioral Research」および「Journal of Educational and Behavioral Statistics」の 3 誌を対象とし, 2020 年から 2021 年に出版された論文を概観し, Psychometrika 誌で発表された方法と関連する方法についても補足を行った。この際, 後述する多次元 IRT モデルに加えて 4 パラメタロジスティック IRT モデルや一般化線形混合モデルなどの新しい推定法のアイデアを含む論文を選択した。ただし, 特殊なモデルのパラメタを, 比

較的よく知られた方法（メトロポリス・ヘイスティングスアルゴリズムなど）によって推定することを提案している論文については、新しい観点からの推定法を扱ったものではないと考えられ、本稿の趣旨に合わないとは判断し除外した。

以下に、本稿の構成を示す。第 2 節では、IRT モデルの中でも特に、補償型の多次元 IRT モデル（multi-dimensional IRT; MIRT; Reckase, 2009）の項目反応モデルを示す。MIRT モデルは、その名の通り、複数の潜在変数を想定する IRT モデルであり、完全情報項目因子分析（full-information item factor analysis; Bock, Gibbons, & Muraki, 1988）や探索的項目因子分析（exploratory item factor analysis）でも MIRT モデルの項目反応モデルが用いられている。MIRT モデルのパラメタ推定においては、潜在変数の数が多くなることに起因して、統計的推測において重要である周辺尤度を計算するための積分が困難になるという問題、いわゆる次元の呪いが生じる。第 3 節から第 5 節では、第 2 節で述べた問題に対処するための推定法として、MLE・ベイズ推定法に関するアプローチに加え、推定法の歴史としては傍流であったフィデューシアル推測を発展させた方法を扱う。具体的には、第 3 節では MLE における多重積分を回避するパラメタ推定法について紹介する。第 4 節では、ベイズ的な枠組みや機械学習の枠組みを援用した MIRT モデルのパラメタ推定法について紹介する。第 5 節では、MLE やベイズ推定とは異なった考え方に基づく、一般化フィデューシアル推測（generalized fiducial inference; GFI; Hannig, 2009; Hannig, Iyer, Lai, & Lee, 2016）について紹介する。第 6 節では、第 3 節から第 5 節で中心的に扱った項目パラメタの推定法ではなく、潜在特性パラメタに注目し、潜在特性パラメタの推定の信頼区間の構成についての最近の成果を紹介する。第 7 節では、第 2 節から第 6 節を総括し、IRT モデルにおけるパラメタ推定法についての展望を述べる。

2. 多次元項目反応理論モデル

本節では、本研究で用いる記号を準備し、補償型の MIRT の項目反応モデルおよび尤度を示す。次節以降の推定法に必要な記号などについては、必要な段階で導入する。表記については、異なった節において、同じ記号が別の意味になることがあるので注意してほしい。また、原論文とは異なった表記を行っている箇所も多いので、原著を参照する場合には適宜読み替えが必要である。まず、 $i = 1, \dots, I$ を個人、 $j = 1, \dots, J$ を項目、 $k = 1, \dots, K$ を潜在特性パラメタの番号とする。個人 i の長さ K の潜在特性ベクトルを $\boldsymbol{\theta}_i = (\theta_{i1}, \dots, \theta_{iK})^T$ とし、項目 j について、潜在特性 k に対する識別力パラメタ（因子負荷量） a_{jk} を K 個まとめたベクトルを $\mathbf{a}_j = (a_{j1}, \dots, a_{jK})^T$ とする。さらに困難度パラメタを d_j とする。本論文では、簡単のため、2 値の項目反応（正答であれば 1、誤答であれば 0）のみを仮定する。個人 i の項目 j への項目反応を表す確率変数を $X_{ij} \in \{0, 1\}$ とし、 x_{ij} をその実現値とする。

この設定のもと、多次元 2 パラメタロジスティック IRT モデルは、

$$P(X_{ij} = 1 | \boldsymbol{\theta}_i, \mathbf{a}_j, d_j) = \frac{\exp(d_j + \mathbf{a}_j^T \boldsymbol{\theta}_i)}{1 + \exp(d_j + \mathbf{a}_j^T \boldsymbol{\theta}_i)}, \quad (1)$$

多次元 2 パラメタ正規累積 IRT モデルは、

$$P(X_{ij} = 1 | \boldsymbol{\theta}_i, \mathbf{a}_j, d_j) = \int_{-\infty}^{d_j + \mathbf{a}_j^T \boldsymbol{\theta}_i} \phi(t) dt, \quad (2)$$

であり、 $\phi(\cdot)$ は標準正規分布の密度関数である。以下では式 (1) あるいは (2) の正答確率モデルを簡単に MIRT モデルと呼ぶ。なお、潜在特性の数が事前にわかっている、どの潜在特性がどの項目の正答確率に影響を与えるのか事前の想定がある場合には、特定の識別力パラメタを明示的に 0 に固定して他のパラメタを推定することがある。このような場合の MIRT モデルを確認的 MIRT モデルと呼ぶこととする。一方、探索的因子分析モデルのように、潜在特性の数に強い仮定がなく、どの潜在特性パラメタがどの項目に強い影響を持つのかわからない場合、モデルの識別に必要な最低限の制約を識別力パラメタに課してパラメタを推定し、事後的に識別力パラメタ行列を回転することによって解

積可能性を高める操作を行うことがある。このような場合の MIRT モデルを探索的 MIRT モデルと呼ぶこととする。

式 (1) あるいは (2) の正答確率を π_{ij} とおくと、個人 i の項目 j への反応の尤度は $L(x_{ij}|\boldsymbol{\theta}_i, \mathbf{a}_j, d_j) = \pi_{ij}^{x_{ij}}(1 - \pi_{ij})^{1-x_{ij}}$ となる。局所独立と個人の交換可能性を仮定すると、項目パラメタと潜在特性の同時尤度は、

$$L(\mathbf{X}|\boldsymbol{\Theta}, \mathbf{A}, \mathbf{d}) = \prod_i \prod_j L(x_{ij}|\boldsymbol{\theta}_i, \mathbf{a}_j, d_j) = \prod_i \prod_j \pi_{ij}^{x_{ij}}(1 - \pi_{ij})^{1-x_{ij}}, \quad (3)$$

である。ここで、 $\boldsymbol{\Theta} = (\theta_{ik})_{I \times K}$ 、 $\mathbf{A} = (a_{jk})_{J \times K}$ 、 $\mathbf{d} = (d_1, \dots, d_J)$ 、 $\mathbf{X} = (x_{ij})_{I \times J}$ とおいた。項目パラメタの周辺尤度は、適当な事前分布 $g(\cdot)$ を潜在特性 $\boldsymbol{\Theta}$ に仮定して

$$L(\mathbf{X}|\mathbf{A}, \mathbf{d}) = \int_{\boldsymbol{\Theta}} L(\mathbf{X}|\boldsymbol{\Theta}, \mathbf{A}, \mathbf{d}) g(\boldsymbol{\Theta}) d\boldsymbol{\Theta}, \quad (4)$$

と多重積分をすることで得られる。項目パラメタの周辺尤度を計算する際には、この積分が大きな問題となる。

3. 最尤推定法における多重積分の回避

3.1. 周辺尤度の評価の回避

MIRT モデルの項目パラメタは $\boldsymbol{\xi} = \{\mathbf{A}, \mathbf{d}\}$ であり、最尤推定量 $\hat{\boldsymbol{\xi}}$ (maximum likelihood estimator) は、

$$\hat{\boldsymbol{\xi}} = \arg \max_{\boldsymbol{\xi}} \log L(\mathbf{X}|\boldsymbol{\xi}), \quad (5)$$

と表され、尤度方程式

$$\frac{\partial \log L(\mathbf{X}|\boldsymbol{\xi})}{\partial \boldsymbol{\xi}} = \mathbf{0}, \quad (6)$$

を $\boldsymbol{\xi}$ について解くことで求められる。ただし、 $\mathbf{0}$ は長さがパラメタ数で要素がすべて 0 のベクトルである。高次元 MIRT モデルにおいては、式 (4) の多重積分に起因して、式 (6) の対数周辺尤度の項目パラメタについての偏導関数の評価が困難となる。

通常の EM アルゴリズムでは、E-step (expectation step) において、現在の項目パラメタの推定値 ($\boldsymbol{\xi}^{\text{old}}$) とデータで条件づけた潜在特性 $\boldsymbol{\Theta}$ の条件付き分布 $p(\boldsymbol{\Theta}|\mathbf{X}, \boldsymbol{\xi}^{\text{old}})$ および式 (3) の尤度の対数 $\log L(\mathbf{X}|\boldsymbol{\Theta}, \boldsymbol{\xi})$ を用いて、

$$Q(\boldsymbol{\xi}|\boldsymbol{\xi}^{\text{old}}) = \int \log L(\mathbf{X}|\boldsymbol{\Theta}, \boldsymbol{\xi}) p(\boldsymbol{\Theta}|\mathbf{X}, \boldsymbol{\xi}^{\text{old}}) d\boldsymbol{\Theta}, \quad (7)$$

という関数を計算する。次に、M-step (maximization step) で、 $Q(\boldsymbol{\xi}|\boldsymbol{\xi}^{\text{old}})$ を最大化するパラメタ $\boldsymbol{\xi}^{\text{new}}$ を

$$\boldsymbol{\xi}^{\text{new}} = \arg \max_{\boldsymbol{\xi}} Q(\boldsymbol{\xi}|\boldsymbol{\xi}^{\text{old}}), \quad (8)$$

と求める。そして、収束基準が満たされるまで、 $\boldsymbol{\xi}^{\text{new}}$ を $\boldsymbol{\xi}^{\text{old}}$ に代入して E-step と M-step を反復する、という手続きを繰り返す。

Cai (2010) は、Fisher's identity (Fisher, 1925) とよばれる等式、

$$\frac{\partial \log L(\mathbf{X}|\boldsymbol{\xi})}{\partial \boldsymbol{\xi}} = \int \frac{\partial \log L(\mathbf{X}|\boldsymbol{\theta}, \boldsymbol{\xi})}{\partial \boldsymbol{\xi}} p(\boldsymbol{\theta}|\mathbf{X}, \boldsymbol{\xi}) d\boldsymbol{\theta}, \quad (9)$$

を用いて、対数周辺尤度のパラメタについての偏導関数の評価を回避する方法を提案した。式 (9) の右辺の $\partial \log L(\mathbf{X}|\boldsymbol{\theta}, \boldsymbol{\xi}) / \partial \boldsymbol{\xi}$ は、項目パラメタと潜在特性の対数同時尤度のパラメタについての偏導関数であり、右辺が評価できれば、左辺の勾配が評価できることになる。さらに、式 (6) と (9) を合わせると、最尤推定量 $\boldsymbol{\xi}$ を求める問題は、

$$\mathbb{E}_{p(\boldsymbol{\theta}|\mathbf{X}, \boldsymbol{\xi})} \left[\frac{\partial \log L(\mathbf{X}|\boldsymbol{\theta}, \boldsymbol{\xi})}{\partial \boldsymbol{\xi}} \right] = \mathbf{0}, \quad (10)$$

と表され、回帰関数の根を求める問題として定式化される。このような回帰関数の根を求める汎用的な手続きが Robbins-Monro アルゴリズム (Robbins & Monro, 1951) である。

ここで、パラメタが 1 つの場合の Robbins-Monro アルゴリズムを簡単に紹介する。ここでの説明は、Bishop (2006, p.95) を改変したものである。まず、2 つの確率変数 z, w を考え、回帰関数 $f(w)$ を

$$f(w) = \mathbb{E}_{p(z|w)}[z] = \int z p(z|w) dz, \quad (11)$$

と定義し、 $f(w^*) = 0$ となる w^* を求める問題を考える。 z の条件付き分散が有限で、 $w > w^*$ のときは $f(w) > 0$ 、 $w < w^*$ のときは $f(w) < 0$ であるとする。このとき、 w^* を推定する系列 ($m = 1, \dots, M$) を

$$w^{(m)} = w - \gamma^{(m-1)} z(w^{(m-1)}), \quad (12)$$

とする（上付き添字の (m) は反復数をあらわす）。 $z(w^{(m-1)})$ は、条件付き分布 $p(z|w^{(m-1)})$ に従う確率変数 Z の実現値である（対数尤度の導関数が 0 になるパラメタ点を探す問題では、 $z(w^{(m-1)}) =$

$-\frac{\partial}{\partial w^{(m-1)}} \log p(z^{(m)}|w^{(m-1)})$ とおく）。 $\gamma^{(m)}$ は

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \gamma^{(m)} = 0, \sum_{m=1}^{\infty} \gamma^{(m)} = \infty, \sum_{m=1}^{\infty} (\gamma^{(m)})^2 < \infty, \quad (13)$$

を満たす係数である。この条件のもと、式 (12) の系列は、確率 1 で $f(w^*) = 0$ となる w^* に収束する。 $\gamma^{(m)}$ についての 1 つ目の条件は、系列が収束するように変化量を徐々に減らすためのものである。2 つ目の条件は、系列が目標の根以外に早く収束しないようにしている。3 つ目の条件は、累積された分散が有限の分散であり、収束を阻害しないことを保証している。

Cai (2010) の MH-RM (Metropolis-Hastings Robbins-Monro) アルゴリズムは、上記の Robbins-Monro アルゴリズムを拡張したものである。まず、初期値を $\{\boldsymbol{\xi}^{(0)}, \boldsymbol{\Gamma}^{(0)}\}$ とし、 $\boldsymbol{\Gamma}^{(0)}$ をパラメタ数 $\times$ パラメタ数の対称正定値行列とする。第 m 回目の反復の MH-RM は以下の手続きからなる (Cai, 2010, p.40)。

1. 確率的代入 (Stochastic imputation) ステップ：MH サンプルングを用いて、 $p(\boldsymbol{\theta}|\mathbf{X}, \boldsymbol{\xi}^{(m-1)}) \propto L(\mathbf{X}|\boldsymbol{\theta}, \boldsymbol{\xi}^{(m-1)})$ から、 $T^{(m)}$ 個の $\boldsymbol{\theta}_t^{(m)}$ ($t = 1, \dots, T^{(m)}$) をサンプルングする。
2. 確率的近似 (stochastic approximation) ステップ：式 (9) の観測データの対数尤度の導関数を、項目パラメタと潜在特性の対数同時尤度の導関数の平均で近似する。すなわち、

$$\tilde{\mathbf{s}}^{(m)} = \frac{1}{T^{(m)}} \sum_{t=1}^{T^{(m)}} \left. \frac{\partial \log L(\mathbf{X}|\boldsymbol{\theta}_t^{(m)}, \boldsymbol{\xi})}{\partial \boldsymbol{\xi}} \right|_{\boldsymbol{\xi}=\boldsymbol{\xi}^{(m-1)}}, \quad (14)$$

とする。さらに、完全データの情報行列を

$$H(\boldsymbol{\xi}|\mathbf{X}, \boldsymbol{\theta}) = -\frac{\partial^2 \log L(\mathbf{X}|\boldsymbol{\theta}, \boldsymbol{\xi})}{\partial \boldsymbol{\xi} \partial \boldsymbol{\xi}^T}, \quad (15)$$

とし、その条件付き期待値を

$$\mathbf{\Gamma}^{(m)} = \mathbf{\Gamma}^{(m-1)} + \gamma^{(m-1)} \left\{ \frac{1}{T^{(m)}} \sum_{t=1}^{T^{(m)}} H(\xi^{(m-1)} | \mathbf{x}, \boldsymbol{\theta}_t^{(m)}) - \mathbf{\Gamma}^{(m-1)} \right\}, \quad (16)$$

と近似する。

3. Robbins-Monro 更新：新しいパラメタの推定値を

$$\xi^{(m)} = \xi^{(m-1)} + \gamma^{(m-1)} \left((\mathbf{\Gamma}^{(m)})^{-1} \mathbf{z}^{(m)} \right), \quad (17)$$

とする。

4. 上記のステップ 1~3 を収束するまで反復する。

実際的には、 $\gamma^{(m)} = 1/m$ であり、 $\mathbf{\Gamma}^{(0)}$ は任意にとれる。また、 $T^{(m)}$ はすべての m に対して、一定の T でもよい。MH-RM アルゴリズムの肝は、対数周辺尤度の勾配の直接の評価を避けて、扱いやすい項目パラメタと潜在特性の対数同時尤度の勾配を用いて評価するという点にある。さらに期待値の計算を、MCMC サンプルによって計算するという 2 段階の工夫により、積分計算の困難を回避している。MH-RM アルゴリズムは、R の mirt パッケージ (Chalmers, 2012) や flexMIRT (Houts & Cai, 2015) といったソフトウェアで利用できる。MH-RM アルゴリズムは、混合効果を含む識別力・困難度パラメタに加え、当て推量・スリップパラメタを持つ 4 パラメタ MIRT モデルのパラメタ推定にも応用されており (Chalmers, 2015)、広範な IRT モデルで利用可能である。

Cai (2010)の方法と類似した方法として、確率的 EM アルゴリズム (stochastic EM algorithm; StEM) を用いた方法が S. Zhang, Chen, and Liu (2020)によって提案されている。S. Zhang, Chen, and Liu (2020)は $\boldsymbol{\theta}$ を条件付き分布からサンプリングする際に、効率的な適応的棄却サンプリングによる MCMC を利用し、式 (7) の E-step の $Q(\xi | \xi^{\text{old}})$ を近似的に計算している。MH-RM アルゴリズムとの違いも議論されており (S. Zhang, Chen, and Liu, 2020; pp.51-52)、1. MH-RM アルゴリズムが $\gamma^{(m)}$ の設定に敏感であるという欠点を、StEM アルゴリズムは有しないこと、2. MH-RM アルゴリズムは早期停止する可能性があるが、StEM アルゴリズムの停止規則は M-step で得られるパラメタの漸近的な性質によって保証されていること、3. MH-RM アルゴリズムは MH サンプラーを使っているためチューニングパラメタの調整が必要だが、StEM アルゴリズムの MCMC はその必要がないこと、4. StEM アルゴリズムの方が、MH-RM アルゴリズムよりも柔軟で拡張性が高いことを挙げている。関連して、Chen and Wang (2021)は MIRT モデルの EM アルゴリズムを混合分布モデルのものとして解釈して詳細に検討し、EM アルゴリズムの各反復で再スケール化を行ったほうがアルゴリズムの収束が速いことシミュレーションにより示した。

3.2. 制約付き同時最尤推定法

JMLE は潜在特性パラメタと項目パラメタを同時に推定する推定法である。具体的には、JMLE では項目パラメタと潜在特性の対数同時尤度を

$$\{\hat{\boldsymbol{\theta}}, \hat{\mathbf{A}}, \hat{\mathbf{d}}\} = \arg \max_{\boldsymbol{\theta}, \mathbf{A}, \mathbf{d}} \log L(\mathbf{X} | \boldsymbol{\theta}, \mathbf{A}, \mathbf{d}), \quad (18)$$

と最大化する潜在特性・項目パラメタを推定値とする。しかし、項目数を固定しサンプルサイズを無限にする漸近的な設定では、局外母数である $\boldsymbol{\theta}_i$ の数も同時に増加してしまい、 $\hat{\mathbf{A}}$ と $\hat{\mathbf{d}}$ の一致性がないため (Neyman & Scott, 1948) 好ましくないとされている (e.g., 村木, 2011)。こうしたことから、JMLE は、MMLE が開発される前に利用されていた簡便な方法として位置づけられている。

Chen, Li, and Zhang (2019)は、母集団の MIRT モデルがある条件を満足している場合に、潜在特性・項目パラメタのどちらも一貫的な推定量を与える制約付き JMLE (constrained JMLE; CJMLE) を提案

した。これにより、潜在特性パラメタの周辺化を行う必要がなくなり、潜在特性パラメタと項目パラメタを交互に最適化しながら、それぞれの最適化プロセスの中での並列化もできるようになり、周辺尤度を用いる推定法よりも高速な推定が実現された。

古典的な JMLE ではすべての反応が正答・誤答である個人・項目を推定に利用することができない。CJMLE ではこの問題を克服するために、式 (18) の最適化問題に制約を加え、

$$\{\hat{\boldsymbol{\theta}}, \hat{\mathbf{A}}, \hat{\mathbf{d}}\} = \arg \max_{\boldsymbol{\theta}, \mathbf{A}, \mathbf{d}} \log L(\mathbf{X} | \boldsymbol{\theta}, \mathbf{A}, \mathbf{d}), \text{ s.t. } \sqrt{1 + \|\boldsymbol{\theta}_i\|^2} \leq C, \sqrt{d_j^2 + \|\mathbf{a}_j\|^2} \leq C, \forall i, j, \quad (19)$$

とする。ここで、 $\|\mathbf{y}\|^2$ はベクトル $\mathbf{y} = (y_1, \dots, y_K)$ のユークリッドノルムで $\sqrt{y_1^2 + y_2^2 + \dots + y_K^2}$ である。正の定数 C はパラメタの正則化の程度を表す定数で、事前に決定される。式 (19) の制約で与えられる実行可能集合がコンパクトで、目的関数が連続であることから、式 (19) の最適化問題は少なくとも 1 つ解を持つことが保証される。式 (19) の最適化問題は、回転の不定性により一意な解を持たない点に注意が必要である。Chen et al. (2019) は、サンプルサイズと項目数をどちらも無限大にするという漸近的な設定を考察し、適当な正則条件 (Chen et al. 2019, p.128 を参照) のもと、CJMLE による潜在特性・項目パラメタの推定量が (回転の自由度を除いて) 一致性を持つことを示した。

CJMLE の最適化計算には射影勾配降下更新 (projected gradient descent update) を用いる。射影子 (projection operator) を

$$\text{Prox}_C(\mathbf{y}) = \arg \min_{\mathbf{x}: \|\mathbf{x}\| \leq C} \|\mathbf{y} - \mathbf{x}\|^2 = \begin{cases} \mathbf{y} & \text{if } \|\mathbf{y}\| \leq C, \\ \frac{C}{\|\mathbf{y}\|} \mathbf{y} & \text{if } \|\mathbf{y}\| > C, \end{cases} \quad (20)$$

とする。 $\text{Prox}_C(\mathbf{y})$ は、 $\mathbf{y}$ の実行可能集合への射影を返す関数である。微分可能な凸関数 $f(\mathbf{x})$ の最適化問題 $\min_{\mathbf{x}} f(\mathbf{x}), \text{ s.t. } \|\mathbf{x}\| \leq C$ に対して、 f の勾配を g とすると、反復数が m 時点での射影勾配降下更新は、 $\mathbf{x}^{(m)} = \text{Prox}_C(\mathbf{x}^{(m-1)} - \eta g(\mathbf{x}^{(m-1)}))$ である。ここで $\eta > 0$ は直線探索の更新幅である。更新幅が十分に小さく、 $\|g(\mathbf{x}^{(m)})\| \neq 0$ や他の正則条件のもとで、射影勾配降下更新は $f(\mathbf{x}^{(m+1)}) < f(\mathbf{x}^{(m)})$ となる。

射影勾配降下更新を用いて、CJMLE の交互最小アルゴリズムは以下のようになる。

1. 潜在特性数 K 、制約パラメタ C を決め、潜在特性パラメタ ($\boldsymbol{\theta}$) と項目パラメタ ($\boldsymbol{\xi}$) を初期化する ($\boldsymbol{\theta}^{(0)}, \boldsymbol{\xi}^{(0)}$)。また、 x_{ij} の非欠測指標を ω_{ij} とする (欠測していなければ $\omega_{ij} = 1$ 、欠測していれば $\omega_{ij} = 0$ とする)。
2. 第 m 番目の反復において、以下を並列計算する。 $\boldsymbol{\theta}_i^{(m)} = \text{Prox}_{\sqrt{C^2-1}}(\boldsymbol{\theta}_i^{(m-1)} - \eta \mathbf{g}_i^{(m-1)})$ 、ここで $\mathbf{g}_i^{(m-1)}$ は、 $-\sum_j \omega_{ij} \partial \log L(x_{ij} | \boldsymbol{\theta}_i, \mathbf{a}_j^{(m-1)}, d_j^{(m-1)}) / \partial \boldsymbol{\theta}_i$ の $\boldsymbol{\theta}_i^{(m-1)}$ での勾配である。
3. $\boldsymbol{\theta}_i^{(m)}, \forall i$ を所与とする。以下を並列計算する。 $\boldsymbol{\xi}_j^{(m)} = \text{Prox}_{\sqrt{C^2-1}}(\boldsymbol{\xi}_j^{(m-1)} - \eta \tilde{\mathbf{g}}_j^{(m-1)})$ とする。ここで $\tilde{\mathbf{g}}_j^{(m-1)}$ は、 $-\sum_i \omega_{ij} \partial \log L(x_{ij} | \boldsymbol{\theta}_i^{(m)}, \boldsymbol{\xi}_j) / \partial \boldsymbol{\xi}_j$ の、 $\boldsymbol{\xi}_j^{(m-1)}$ での勾配である。
4. 反復回数が既定値 M になるか、収束基準を満足するまで、上記ステップ 2, 3 を繰り返す。最終反復時点での値をパラメタの推定値とする。

MIRT モデルは因子分析と同様に潜在特性数を事前に指定する必要があるが、Chen et al. (2019) では交差妥当化 (cross validation) により潜在特性数を決定した。さらに、Chen et al. (2019) は、MH-RM アルゴリズムよりも CJMLE の方が極めて高速であることを数値実験により示した。CJMLE は R の mirtjml パッケージ (S. Zhang, Chen, & Li, 2020) によって実行できる。

Chen et al. (2019) の研究に触発された研究はいくつかあるが、Liu (2020) は大規模なデータにも MIRT モデルを適用可能にする方法として、JMLE の最適化法をリーマン最適化 (Riemannian optimization) に改良した。MIRT モデルは、データが 2 値の行列分解問題とみなす事ができる。分解された低ランクの行列の多様体を探索する方法の一つが、前述の Chen et al. (2019) の交互最小アルゴリズムであった。

Liu (2020) のリーマン最適化は、一次と二次の罰則法とリーマン共役勾配による最適化を組み合わせたもので、数値実験的にも、Chen et al. (2019) よりも高速な推定が可能となっている。実際の最適化アルゴリズムは非常に複雑であるため、ここでは割愛する。

3.3. 特異値分解による方法

Chen et al. (2019) の研究に触発された別の研究として、H. Zhang, Chen, and Li (2020) がある。H. Zhang, Chen, and Li (2020) は特異値分解 (singular value decomposition; SVD) を用いて、MIRT モデルのパラメータ推定を実行するアルゴリズムを提案した。SVD はすべての行列に対して定義できる行列分解であり、これを行列の基礎と位置づけているテキストも存在する (足立・村上, 2011)。また、SVD は、因子分析 (e.g., Adachi, 2012; Adachi, 2016) や機械学習の領域での ℓ_2 正則化法 (リッジ回帰) の理論とも関係しており (e.g., Hastie, 2020), 統計的推測の様々な場面で登場する方法である。

さて、H. Zhang, Chen, and Li (2020) の SVD を用いた MIRT モデルのパラメータ推定のアルゴリズムは、以下のようになっている。

1. 潜在特性数 K , 打ち切りパラメータ $\epsilon_{I,J} > 0$ を決定し, リンク関数 $f(x)$ (式 (1) や (2) のロジット関数やプロビット関数) の逆関数 $f^{-1}(x)$ を用意する。
2. データ行列 $\mathbf{X}$ に対して, SVD を実行し, $\mathbf{X} = \sum_{j=1}^J \sigma_j \mathbf{u}_j \mathbf{v}_j^T$ を得る。ここで, $\sigma_1 \geq \dots \geq \sigma_J \geq 0$ は, 特異値であり, $\mathbf{u}_j$ と $\mathbf{v}_j$ はそれぞれ左・右特異ベクトルである。
3. ここで $\mathbf{Y} = (y_{ij})_{I \times J} = \sum_{k=1}^{\tilde{K}} \sigma_k \mathbf{u}_k \mathbf{v}_k^T$ とする。ただし, $\tilde{K} = \max \left\{ K + 1, \arg \max_k \{ \sigma_k \geq 1.01\sqrt{I} \} \right\}$ である。

$$4. \quad \hat{\mathbf{Y}} = (\hat{y}_{ij})_{I \times J} \text{ を, } \hat{y}_{ij} = \begin{cases} \epsilon_{I,J}, & \text{if } y_{ij} < \epsilon_{I,J}, \\ y_{ij}, & \text{if } \epsilon_{I,J} \leq y_{ij} \leq 1 - \epsilon_{I,J}, \\ 1 - \epsilon_{I,J}, & \text{if } y_{ij} > 1 - \epsilon_{I,J}, \end{cases} \text{ と定義する。}$$

5. $\tilde{\mathbf{Z}} = (\tilde{z}_{ij})_{I \times J}$ を, $\tilde{z}_{ij} = f^{-1}(\hat{y}_{ij})$ により定義する。
6. $\hat{\mathbf{d}} = (\hat{d}_1, \dots, \hat{d}_J)$ を, $\hat{d}_j = \sum_{i=1}^I \tilde{z}_{ij} / I$ により定義する。
7. SVD を, $\hat{\mathbf{Z}} = (\hat{z}_{ij} - \hat{d}_j)_{I \times J}$ に適用し, $\hat{\mathbf{Z}} = \sum_{j=1}^J \hat{\sigma}_j \hat{\mathbf{u}}_j \hat{\mathbf{v}}_j^T$ を得る。ここで, $\hat{\sigma}_1 \geq \dots \geq \hat{\sigma}_J \geq 0$

は, 特異値であり, $\hat{\mathbf{u}}_j$ と $\hat{\mathbf{v}}_j$ はそれぞれ左・右特異ベクトルである。

8. $\hat{\mathbf{A}} = (\hat{\sigma}_1 \hat{\mathbf{v}}_1, \dots, \hat{\sigma}_K \hat{\mathbf{v}}_K) / \sqrt{I}$ と $\hat{\Theta} = \sqrt{I}(\hat{\mathbf{u}}_1, \dots, \hat{\mathbf{u}}_K)$ を出力する。

このアルゴリズムではステップ 2~5 で, 正答・誤答の 2 値反応を SVD により線形化を行ったあとに, ステップ 6~7 で再度 SVD を実行している。2 度目の SVD は, 本質的には, 線形化されたデータに対して主成分分析を実行していることになる。また, このアルゴリズムでは, 潜在特性に分布の仮定をおかない点も特徴の一つである。SVD による推定量も, 緩やかな条件のもと, 斜交回転の自由度があるが, サンプルサイズと項目数が無限大の漸近的な状況で一致性があることが示されている (H. Zhang, Chen, & Li, 2020, pp.361-362)。ここで, 事前に設定する打ち切りパラメータ $\epsilon_{I,J}$ に添え字がついているが, これは I, J が無限大になることに伴って 0 に減衰するように $\epsilon_{I,J}$ を設定する必要があるためである (H. Zhang, Chen, & Li, 2020, p.361, Remark 5)。 $\epsilon_{I,J}$ の選択はアルゴリズムの統計的な一致性に影響するため, $\epsilon_{I,J}$ はサンプルサイズ I と項目数 J に応じて, 値を変更する必要があるパラメータであるといえる。このアルゴリズムは CJMLE や MH-RM アルゴリズムよりも実行速度がかなり速いことが, シミ

ュレーションにより示されている。推定の精度については、数値実験的には、CJMLE などの方法に及ばない結果となっているが、SVD を CJMLE の初期値とする事もできる。

欠測値がある場合のアルゴリズムも、上記のものを修正する形で示されている (H. Zhang, Chen, & Li, 2020; Algorithm 2. p. 366)。さらに、順序データに対するアルゴリズムも同時に提案している (H. Zhang, Chen, & Li, 2020; Algorithm 3. p. 367)。こうしたアルゴリズムにより、サンプルサイズが大きく、項目数や因子数も多い状況でも、長くとも数十秒程度で MIRT モデルのパラメタ推定が可能となった。

4. ベイズ的推定法と近似推論・機械学習アルゴリズム

前節のアルゴリズムは、潜在特性パラメタと項目パラメタの最尤推定量を得るためのものであった。本節では、ベイズ的推定法や近似推論、機械学習のアルゴリズムといった推定法の展開について紹介する。

4.1. Pólya-Gamma 分布による Gibbs サンプルング法の構成

本項では、MCMC を用いたパラメタ推定法を紹介する。一般的に、MCMC の中でも、Gibbs サンプルングアルゴリズムは、MH アルゴリズムなどの採択・棄却型の MCMC と比べて効率がよい。しかし、Gibbs サンプルングアルゴリズムはサンプルしたいパラメタ以外のパラメタとデータで条件づけた分布の解析的な形が知られていないと利用できないという限界もある。

IRT モデルの文脈では、式 (2) のような、正規累積型の IRT モデルでの Gibbs サンプルングアルゴリズムとして、Albert (1992) および Albert and Chib (1993) によるデータ拡大法 (data augmentation) が知られている。この方法は、Béguin and Glas (2001) により MIRT に拡張され、マルチレベル MIRT モデルの Gibbs サンプルングアルゴリズムにも利用されている (Fox & Glas, 2001)。確認的 MIRT モデルへの MCMC の応用例については、Edwards (2010) に解説がある。また、MIRT モデルではないものの、Maris, Bechger, and Martin (2015) は、拡張周辺 Rasch モデル (extended marginal Rasch model) に対する Gibbs サンプルングアルゴリズムを構成した。関連して、4 パラメタ IRT モデルにおいては、4 パラメタ IRT モデルを混合モデルとして定式化した場合の MAP 推定を行うアルゴリズム (Meng, Xu, Zhang, & Tao, 2020) に加えて、Gibbs サンプルングアルゴリズム (e.g., Culpepper, 2016; Fu, Zhang, Su, Shi, & Tao, 2021) が開発されている。さらに、縮小事前分布の一種である Spike-and-slab 事前分布を用いて、ベイズ的な推定法により探索的な MIRT モデルにおける識別力パラメタ行列の単純構造を推定する方法も提案されている (Fontanella, Fontanella, Valentini, & Trendafilov, 2019)。また、Chen (2020) は、Bayesian Lasso の方法を用いて、識別力パラメタの一部を自動的に 0 と推定する方法を提案した。

その一方、ロジスティック型の IRT モデルにおいては、パラメタの完全条件付き分布が簡単な形にならず、効率的な Gibbs サンプルングはこれまで知られてこなかった。しかし、Polson, Scott, and Widle (2013) が Pólya-Gamma 分布を用いて、ロジスティック回帰モデルの効率的な Gibbs サンプルングを提案し、Jiang and Templin (2019) はこれを応用して、ロジスティック型の MIRT モデルのための Gibbs サンプルングアルゴリズムを提案した。

以下では、Pólya-Gamma 分布によるロジスティック回帰モデルのための Gibbs サンプルング法の構成を概説し、その後 MIRT モデルへの応用を示す。基本的な説明は、Jiang and Templin (2019) に依拠するが、Pólya-Gamma 分布を用いたロジスティック回帰モデルのパラメタ推定については Scott and Sun (2013) も参考になる。まず、確率変数 W がパラメタ $b > 0, c \in \mathbb{R}$ の Pólya-Gamma 分布に従うことを $W \sim PG(b, c)$ とかく。 $PG(b, c)$ は

$$PG(b, c) = \sum_{l=1}^{\infty} \frac{G_l(b, 1)}{\left(2\pi^2 \left(l - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{c^2}{2}\right)}, \quad (21)$$

と定義される。 $G_l(b, 1), l = 1, 2, \dots$ は、パラメタを b と1とするガンマ分布に、相互に独立に従う確率変数であり、Pólya-Gamma 分布はガンマ分布に従う確率変数の無限混合分布である。

ここで独立変数と回帰係数の長さ p のベクトルをそれぞれ $\mathbf{z}_i$ と $\boldsymbol{\beta}$ とするロジスティック回帰モデルを考え、 $\psi_i = \mathbf{z}_i^\top \boldsymbol{\beta}$ とおく。個人 i の試行回数を n_i 、成功回数を y_i として、尤度が二項分布である場合の個人 i の尤度への寄与は、

$$\frac{\exp(\psi_i)^{y_i}}{(1 + \exp(\psi_i))^{n_i}} \propto \exp(\kappa_i \psi_i) \int_0^\infty \exp\left(\frac{-w_i \psi_i^2}{2}\right) p(w_i | n_i, 0) dw_i, \quad (22)$$

となる。ここで、 $\kappa_i = y_i - n_i/2$ で、 $p(w_i | n_i, 0)$ は、パラメタが $b = n_i$ と $c = 0$ である Pólya-Gamma 分布の w_i の密度である。なお、従属変数が2値の場合、 $n_i = 1, y_i \in \{0, 1\}$ と考えればよい。 $\boldsymbol{\beta}$ の事前分布を平均ベクトル $\boldsymbol{\mu}_\beta$ 、分散共分散行列 Σ_β とする多変量正規分布 $p(\boldsymbol{\beta} | \boldsymbol{\mu}_\beta, \Sigma_\beta) = N(\boldsymbol{\mu}_\beta, \Sigma_\beta)$ とすると、 $\mathbf{w} = (w_1, \dots, w_I)$ で条件づけた $\boldsymbol{\beta}$ の事後分布は

$$p(\boldsymbol{\beta} | \mathbf{w}, \boldsymbol{\kappa}) \propto p(\boldsymbol{\beta} | \boldsymbol{\mu}_\beta, \Sigma_\beta) \prod_{i=1}^I \exp\left(\kappa_i \psi_i - \frac{w_i \psi_i^2}{2}\right) \propto p(\boldsymbol{\beta} | \boldsymbol{\mu}_\beta, \Sigma_\beta) \exp\left(-\sum_{i=1}^I \frac{(\kappa_i - \psi_i)^2 w_i}{2}\right), \quad (23)$$

となる。ただし、 $\boldsymbol{\kappa} = (\kappa_1, \dots, \kappa_I)$ である。式 (23) の指数関数の中の形式から、多変量正規分布の密度関数が連想されるが、実際、 $\boldsymbol{\gamma} = (\kappa_1/w_1, \dots, \kappa_I/w_I)^\top, \boldsymbol{\Omega} = \text{diag}(w_1, \dots, w_I), \mathbf{Z} = (\mathbf{z}_1^\top, \dots, \mathbf{z}_I^\top)^\top$ とすると、

$$p(\boldsymbol{\beta} | \mathbf{w}, \boldsymbol{\kappa}) \propto \exp\left(-\frac{(\boldsymbol{\beta} - \boldsymbol{\mu}_\beta)^\top \Sigma_\beta^{-1} (\boldsymbol{\beta} - \boldsymbol{\mu}_\beta)}{2}\right) \exp\left(-\frac{(\boldsymbol{\gamma} - \mathbf{Z}\boldsymbol{\beta})^\top \boldsymbol{\Omega} (\boldsymbol{\gamma} - \mathbf{Z}\boldsymbol{\beta})}{2}\right), \quad (24)$$

であり、 $\boldsymbol{\beta}$ について平方完成をすると、結局、 $p(\boldsymbol{\beta} | \mathbf{w}, \boldsymbol{\kappa}) = N(\boldsymbol{\mu}_\beta^*, \Sigma_\beta^*)$ という多変量正規分布が得られる。ただし、 $\boldsymbol{\mu}_\beta^*$ と Σ_β^* は平均ベクトルと分散共分散行列であり、

$$\boldsymbol{\mu}_\beta^* = \Sigma_\beta^* (\mathbf{Z}^\top \boldsymbol{\kappa} + \Sigma_\beta^{-1} \boldsymbol{\mu}_\beta), \Sigma_\beta^{*-1} = \mathbf{Z}^\top \boldsymbol{\Omega} \mathbf{Z} + \Sigma_\beta^{-1}, \quad (25)$$

である。この結果を用いて、Pólya-Gamma 分布を用いた Gibbs サンプルングアルゴリズムは、

1. $\boldsymbol{\kappa}$ を計算して、 $\boldsymbol{\beta}$ を $\boldsymbol{\beta}^{(0)}$ と初期化し、MCMC イテレーションカウンタを $m = 1$ とする、
2. $i = 1, \dots, I$ に対して、 $w_i^{(m-1)}$ を、 $PG(n_i, \mathbf{z}_i^\top \boldsymbol{\beta}^{(m-1)})$ からサンプリングする、
3. $\boldsymbol{\mu}_\beta^{(m-1)}, \Sigma_\beta^{(m-1)}$ を計算し、 $\boldsymbol{\beta}^{(m)}$ を $N(\boldsymbol{\mu}_\beta^{(m-1)}, \Sigma_\beta^{(m-1)})$ からサンプリングする、
4. m が事前に決めた最大イテレーション数の場合はアルゴリズムを終了し、そうでない場合は、 $m = m + 1$ としてステップ2に戻る、

となる。このように、潜在変数 w_i からのサンプリングのステップを含めることで、 $\boldsymbol{\beta}$ の完全条件付き事後分布が正規分布という極めて簡単な分布になり、サンプリングが容易に実行できる。

なお、Pólya-Gamma 分布からの乱数は、R では、BayesLogit パッケージ (Polson, Scott, Windle, Oksanen, & Balamuta, 2019) の `rpg` 関数や `pgdraw` パッケージ (Schmidt & Makalic, 2019) の `pgdraw` 関数を利用できる。また、Mplus (Muthén, and Muthén, 1998-2017) においても、Version 8.5 以上で、Pólya-Gamma 分布を用いたサンプリングを用いた分析を実行できる (Asparouhov & Muthén, 2021)。

この方法にもとづいて、式 (1) のロジスティック型の MIRT モデルの完全条件付き事後分布を導出できる。ただし、Jiang and Templin (2019)は探索的 MIRT モデルではなく確認的 MIRT モデルを想定している。まず、 $\kappa_{ij} = y_{ij} - 1/2, \forall i, j$ を計算しておく。 $\boldsymbol{\theta}_i$ の事後分布は、

$$p(\boldsymbol{\theta}_i | \Sigma, \mathbf{A}, \mathbf{d}, \mathbf{x}_i) \propto p(\boldsymbol{\theta}_i | \boldsymbol{\mu}_\theta, \Sigma_\theta) \exp\left(-\frac{(\boldsymbol{\gamma}_i - \mathbf{A}^\top \boldsymbol{\theta}_i)^\top \boldsymbol{\Omega}_i (\boldsymbol{\gamma}_i - \mathbf{A}^\top \boldsymbol{\theta}_i)}{2}\right), \quad (26)$$

である。ただし、 $\mathbf{x}_i$ は個人 i の項目反応ベクトル $(x_{i1}, \dots, x_{ij})$ 、 Σ は潜在特性パラメタの分散共分散行列である。 $\boldsymbol{\gamma}_i$ は $\boldsymbol{\gamma}_i = (\kappa_{i1}/w_{i1} - d_1, \dots, \kappa_{ij}/w_{ij} - d_j)^\top$ で定義される長さ J のベクトルで、 $\boldsymbol{\Omega}_i$ は $\boldsymbol{\Omega}_i = \text{diag}(w_{i1}, \dots, w_{ij})$ でサイズが $J \times J$ の対角行列である。先ほどの議論と同様に、 $\boldsymbol{\theta}_i$ の事前分布 $p(\boldsymbol{\theta}_i | \boldsymbol{\mu}_\theta, \Sigma_\theta)$ を

平均ベクトルが μ_{θ} 、分散共分散行列が Σ_{θ} である多変量正規分布とすれば、 θ_i の完全条件付き事後分布も多変量正規分布となり、そのパラメタは式 (25) を用いて計算できる。

困難度パラメタ d_j についても同様に、

$$p(d_j | \theta, \mathbf{a}_j, \mathbf{x}_{(j)}, \mathbf{w}) \propto p(d_j | \mu_{d_j}, \sigma_{d_j}^2) \exp\left(-\frac{(\mathbf{y}_{(j)} - d_j \mathbf{1}_I)^T \boldsymbol{\Omega}_{(j)} (\mathbf{y}_{(j)} - d_j \mathbf{1}_I)}{2}\right), \quad (27)$$

であり、 $\mathbf{x}_{(j)}$ は項目 j の項目反応ベクトル $(x_{1j}, \dots, x_{Ij})$ とする。 $\mathbf{1}_I$ は要素がすべて1で長さ I の縦ベクトルである。 $\mathbf{y}_{(j)}$ と $\boldsymbol{\Omega}_{(j)}$ については、 $\mathbf{y}_i$ と $\boldsymbol{\Omega}_i$ とほとんど対称の関係にあり、 $\mathbf{y}_{(j)} = (\kappa_{1j}/w_{1j} - \mathbf{a}_1^T \boldsymbol{\theta}_1, \dots, \kappa_{Ij}/w_{Ij} - \mathbf{a}_I^T \boldsymbol{\theta}_I)^T$ の長さは I 、 $\boldsymbol{\Omega}_{(j)}$ はサイズが $I \times I$ の対称行列で $\boldsymbol{\Omega}_{(j)} = \text{diag}(w_{1j}, \dots, w_{Ij})$ である。 d_j の事前分布 $p(d_j | \mu_{d_j}, \sigma_{d_j}^2)$ に、平均 μ_{d_j} 、分散 $\sigma_{d_j}^2$ の正規分布を選択すれば、事前分布の共役性から、 d_j の完全条件付き事後分布も正規分布になる

識別力パラメタについては、モデルの識別性のための制約が必要である点に注意が必要である。具体的には、MIRTモデルの識別のためには、識別力パラメタ行列 $\mathbf{A}$ に対して、少なくとも $K(K-1)/2$ 個の制約を課す必要がある。よく知られているのは、識別力パラメタ行列 $\mathbf{A}$ の $K(K-1)/2$ 個の上三角要素を0とする制約で、階段形行列(echelon matrix)と呼ばれる形式をとる (McDonald, 1999, p.181)。そのため、 $a_{jm} = \{a_{ik} | a_{ik} \neq 0, a_{ik} \in \mathbf{A}\}$ という表記を導入する。つまり、 a_{jm} は識別力パラメタのうち0でない要素であるとする。 a_{jm} の事後分布は

$$p(a_{jm} | \theta, \mathbf{a}_{j(-m)}, d_j, \mathbf{x}_i, \mathbf{w}) \propto p(a_{jm} | \mu_{a_{jm}}, \sigma_{a_{jm}}^2) \exp\left(-\frac{(\mathbf{y}_{(jm)} - a_{jm} \boldsymbol{\theta}_{(m)})^T \boldsymbol{\Omega}_{(j)} (\mathbf{y}_{(jm)} - a_{jm} \boldsymbol{\theta}_{(m)})}{2}\right), \quad (28)$$

である。ここで、 $\mathbf{a}_{j(-m)}$ は識別力パラメタベクトル $\mathbf{a}_j$ から m 番目の要素を削除したベクトルである。 $\boldsymbol{\theta}_{(m)} = (\theta_{1m}, \dots, \theta_{Im})^T$ では m 次元目の潜在特性パラメタを I 人分並べたベクトルである。 $\boldsymbol{\Omega}_{(j)}$ は困難度パラメタ d_j のときに定義したものと同様である。 $\mathbf{y}_{(jm)}$ もこれまでと同様に定義され、 $\mathbf{y}_{(jm)} = (\kappa_{1j}/w_{1j} - \mathbf{a}_{1(-m)}^T \boldsymbol{\theta}_{1(-m)} - d_j, \dots, \kappa_{Ij}/w_{Ij} - \mathbf{a}_{I(-m)}^T \boldsymbol{\theta}_{I(-m)} - d_j)^T$ である。ただし、 $\boldsymbol{\theta}_{i(-m)}$ は個人 i の潜在特性パラメタベクトル $\boldsymbol{\theta}_i$ から m 番目の要素を削除したベクトルである。

さらに、識別力パラメタ a_{jm} の事前分布 $p(a_{jm} | \mu_{a_{jm}}, \sigma_{a_{jm}}^2)$ を平均 $\mu_{a_{jm}}$ 、分散 $\sigma_{a_{jm}}^2$ でサポートが $(0, \infty)$ である切断正規分布とすると、 a_{jm} の完全条件付き事後分布は正規分布となる。ただし、この分布からのサンプリングの際にはサンプリングされた値が0以上の場合にのみ採択するように調整する必要がある。潜在変数 w_{ij} の分布はパラメタが $b = 1, c = \mathbf{a}_j^T \boldsymbol{\theta}_i + d_j$ のPólya-Gamma分布

$$p(w_{ij}) \propto PG(1, \mathbf{a}_j^T \boldsymbol{\theta}_i + d_j), \quad (29)$$

であるため、先の示したパッケージの関数を使ってサンプリングができる。

最後に、潜在特性パラメタの分散共分散行列 Σ の密度関数は、多変量正規分布の密度関数に比例するもの、つまり、

$$p(\Sigma | \theta) \propto N(\theta | 0, \Sigma), \quad (30)$$

として、MHサンプラーを用いて、 Σ の要素を更新する。Jiang and Templin (2019)では、潜在特性の分散共分散行列の推定には、Gibbsサンプリングの文脈でよく利用される逆ウィシャート分布を用いるのではなく、要素ごとにMHサンプリングを行っている。その理由は、MIRTモデルの識別性の条件を満足するために、当該の分散共分散行列の対角要素を1に固定する必要がある、さらに、潜在特性間の共分散に制約を課すことを想定しているためである。このとき、MHサンプラーには、平均0、分散0.05の正規分布からの乱数を誤差とする酔歩連鎖を採用している。

Jiang and Templin (2019)は、シミュレーション実験により、提案した Gibbs サンプリングアルゴリズムが、mirt パッケージで実装されている準モンテカルロ法を使った EM アルゴリズムと比較し、潜在特性数・項目数・サンプルサイズが大きい場合に識別力パラメタの推定バイアスや平均二乗誤差の平方根の観点から提案手法が優れていることを示した。また、通常の MH アルゴリズムよりも、提案手法の MCMC サンプルの自己相関が低いことなども報告している。

4.2. 変分ベイズ推論法の応用

MCMC 法は、イテレーションの回数を十分に増やせば、正確な事後分布を再現できることが理論的に保証されている。しかしながら、MCMC 法は乱数生成にもとづくものであり、一般に計算コストが高いという欠点がある。そこで、近似する事後分布に制約を加え、事後分布の導出を最適化問題として解く方法である変分ベイズ法 (Variational Bayes method; VB method; e.g., Bishop, 2006; Blei, Kucukelbir, & McAuliffe, 2017; Galdo, Bahg, & Turner, 2020; Grimmer, 2011; Nakajima, Watanabe, & Sugiyama, 2019;あるいは variational inference と呼ばれる) が有効となる。VB 法は周辺尤度を直接最大化するのではなく、周辺尤度の下界を最大化するという方法としても定式化できる。

IRT モデルは一般化線形混合モデルの枠組みで定式化可能である (e.g., De Boeck & Wilson, 2004)。式 (1) において潜在特性数 $K = 1$ で識別力 a_{ij} を 1 とすると、潜在特性パラメタ θ_i と困難度パラメタ d_j がモデルのパラメタとなる。ここで θ_i と d_j が、パラメタ $\Psi = \{\omega, \zeta\}$ をもつ適当な分布から独立にサンプリングされているとすると $(\theta_i \sim p(\theta_i; \omega), d_j \sim p(d_j; \zeta))$ 、周辺尤度の計算には $I + J$ 重の積分が必要となる。この積分は、 $J + 1$ 個に減らすことができるが、項目数が多い場合には、計算負荷がまだ大きい。Jeon, Rijmen, and Rabe-Hesketh (2017)は項目の変量効果をもつ一般化線形混合モデルのパラメタ推定のために、VB 法により 2 重積分までの積分計算に収まる計算量で周辺尤度の下界を最大化するアルゴリズム (maximization-maximization algorithm; MM algorithm) を提案した。なお、一般化線形混合モデルのパラメタ推定には、Jeon and Rabe-Hesketh (2012)によるプロファイル尤度法 (profile-likelihood method) という MLE ベースの方法も存在する。プロファイル尤度法は、モデルのパラメタの一部を既知とすることで、そのモデルが標準的な形式になる場合に有用な推定法である。Jeon and Rabe-Hesketh (2012)は因子負荷量とそれ以外のパラメタを変数とする尤度関数のうち、因子負荷量以外のパラメタを最尤推定値で置き換えたプロファイル尤度を用いる推定法を提案し、既存の推定プログラムで実行可能な枠組みを示した。しかし、この方法は多重積分の問題を解決するための方法ではない。

本項では、平均場近似にもとづく VB 法の基本的な考え方を紹介するとともに、Jeon et al. (2017)の方法の概要を示す。 θ_i および d_j がそれぞれ $p(\theta_i; \omega)$ および $p(d_j; \zeta)$ からランダムサンプリングされているとすると、データとパラメタの同時確率と対数周辺尤度はそれぞれ

$$p(\mathbf{X}, \boldsymbol{\theta}, \mathbf{d}; \Psi) = \prod_i \prod_j P(X_{ij} = x_{ij} | \theta_i, d_j) \prod_i p(\theta_i; \omega) \prod_j p(d_j; \zeta), \quad (31)$$

および、

$$l(\mathbf{X}; \Psi) = \log p(\mathbf{X}; \Psi) = \log \int_{\boldsymbol{\theta}} \int_{\mathbf{d}} p(\mathbf{X}, \boldsymbol{\theta}, \mathbf{d}; \Psi) d\boldsymbol{\theta} d\mathbf{d}, \quad (32)$$

である。ここでは興味のあるパラメタは Ψ であり、式中ではパラメタで条件付けるのではなくセミコロンで区切って明示している。ここで、変量効果の変分分布 $q(\boldsymbol{\theta}, \mathbf{d})$ を用いて式 (32) を変形し

$$l(\mathbf{X}; \Psi) = \log \int_{\boldsymbol{\theta}} \int_{\mathbf{d}} \left[\frac{p(\mathbf{X}, \boldsymbol{\theta}, \mathbf{d}; \Psi)}{q(\boldsymbol{\theta}, \mathbf{d})} \right] q(\boldsymbol{\theta}, \mathbf{d}) d\boldsymbol{\theta} d\mathbf{d}, \quad (33)$$

とする。log 関数が凸関数であるため、式 (33) にイェンセン不等式を適用すると、

$$l(\mathbf{X}; \Psi) \geq \int_{\Theta} \int_{\mathbf{d}} q(\Theta, \mathbf{d}) \log \left[\frac{p(\mathbf{X}, \Theta, \mathbf{d}; \Psi)}{q(\Theta, \mathbf{d})} \right] d\Theta d\mathbf{d}, \quad (34)$$

$$\begin{aligned} &= \mathbb{E}_{q(\Theta, \mathbf{d})} \left[\log \left[\frac{p(\mathbf{X}, \Theta, \mathbf{d}; \Psi)}{q(\Theta, \mathbf{d})} \right] \right] = \mathbb{E}_{q(\Theta, \mathbf{d})} [\log p(\mathbf{X}, \Theta, \mathbf{d}; \Psi)] - \mathbb{E}_{q(\Theta, \mathbf{d})} [\log q(\Theta, \mathbf{d})], \\ &= \underline{l}(\mathbf{X}; q(\Theta, \mathbf{d}), \Psi), \end{aligned}$$

と対数周辺尤度の下界 $\underline{l}(\mathbf{X}; q(\Theta, \mathbf{d}), \Psi)$ が得られる。対数周辺尤度の下界 $\underline{l}(\mathbf{X}; q(\Theta, \mathbf{d}), \Psi)$ はパラメタのみならず変分分布 $q(\Theta, \mathbf{d})$ の関数であり汎関数である。

ここで、条件付き確率の公式から $p(\mathbf{X}, \Theta, \mathbf{d}; \Psi) = p(\Theta, \mathbf{d}|\mathbf{X}; \Psi)p(\mathbf{X}; \Psi)$ であるため、これを式 (34) に代入すると、

$$\underline{l}(\mathbf{X}; q(\Theta, \mathbf{d}), \Psi) = \mathbb{E}_{q(\Theta, \mathbf{d})} [\log p(\mathbf{X}; \Psi)] + \mathbb{E}_{q(\Theta, \mathbf{d})} [\log p(\Theta, \mathbf{d}|\mathbf{X}; \Psi)] - \mathbb{E}_{q(\Theta, \mathbf{d})} [\log q(\Theta, \mathbf{d})], \quad (35)$$

である。さらに、 $\mathbb{E}_{q(\Theta, \mathbf{d})} [\log p(\mathbf{X}; \Psi)] = \log p(\mathbf{X}; \Psi)$ であること、変分分布 $q(\Theta, \mathbf{d})$ と真の事後分布 $p(\Theta, \mathbf{d}|\mathbf{X}; \Psi)$ の間のカルバック・ライブラー距離 (Kullback-Leibler divergence) が

$$\text{KL}(q(\Theta, \mathbf{d}) || p(\Theta, \mathbf{d}|\mathbf{X}; \Psi)) = -\mathbb{E}_{q(\Theta, \mathbf{d})} [\log p(\Theta, \mathbf{d}|\mathbf{X}; \Psi)] + \mathbb{E}_{q(\Theta, \mathbf{d})} [\log q(\Theta, \mathbf{d})], \quad (36)$$

であることを用いて式 (35) を変形すると、対数周辺尤度 $l(\mathbf{X}; \Psi)$ は

$$l(\mathbf{X}; \Psi) = \underline{l}(\mathbf{X}; q(\Theta, \mathbf{d}), \Psi) - \text{KL}(q(\Theta, \mathbf{d}) || p(\Theta, \mathbf{d}|\mathbf{X}; \Psi)), \quad (37)$$

と表せることがわかる。つまり、対数周辺尤度 $l(\mathbf{X}; \Psi)$ はその下界と変分分布 $q(\Theta, \mathbf{d})$ と真の事後分布 $p(\Theta, \mathbf{d}|\mathbf{X}; \Psi)$ の間のカルバック・ライブラー距離の差で表されるということである。式 (37) から、対数周辺尤度の下界 $\underline{l}(\mathbf{X}; q(\Theta, \mathbf{d}), \Psi)$ を最大化することと、変分分布と真の事後分布の間のカルバック・ライブラー距離 $\text{KL}(q(\Theta, \mathbf{d}) || p(\Theta, \mathbf{d}|\mathbf{X}; \Psi))$ を最小化することは、どちらも周辺尤度 $l(\mathbf{X}; \Psi)$ を最大化するため、等価な問題であるといえる。

もし変分分布 $q(\Theta, \mathbf{d})$ と真の事後分布 $p(\Theta, \mathbf{d}|\mathbf{X}; \Psi)$ が一致すれば $\text{KL}(q(\Theta, \mathbf{d}) || p(\Theta, \mathbf{d}|\mathbf{X}; \Psi)) = 0$ となるが、事後分布の計算には、周辺尤度が必要であるため、ここではその計算が行えないという状況を考えている。そこで、 $q(\Theta, \mathbf{d})$ に対して独立性

$$q(\Theta, \mathbf{d}) \approx \prod_i q_i(\theta_i) \prod_j q_j(d_j), \quad (38)$$

を仮定して分布のクラスを制限した上で、カルバック・ライブラー距離 $\text{KL}(q(\Theta, \mathbf{d}) || p(\Theta, \mathbf{d}|\mathbf{X}; \Psi))$ を最小化する分布を探索する問題を考える。この独立性の仮定を物理学では平均場近似と呼ぶ。この制約のもとでの最適な変分分布は、

$$q_i(\theta_i) = \frac{p(\theta_i; \omega) \exp \left(\sum_j \int_{d_j} q_j(d_j) \log p(x_{ij} | \theta_i, d_j; \Psi) dd_j \right)}{\int_{\theta_i} p(\theta_i; \omega) \exp \left(\sum_j \int_{d_j} q_j(d_j) \log p(x_{ij} | \theta_i, d_j; \Psi) dd_j \right) d\theta_i}, \quad (39)$$

$$q_j(d_j) = \frac{p(d_j; \zeta) \exp \left(\sum_i \int_{\theta_i} q_i(\theta_i) \log p(x_{ij} | \theta_i, d_j; \Psi) d\theta_i \right)}{\int_{d_j} p(d_j; \zeta) \exp \left(\sum_i \int_{\theta_i} q_i(\theta_i) \log p(x_{ij} | \theta_i, d_j; \Psi) d\theta_i \right) dd_j}, \quad (40)$$

と計算される (Jeon et al. 2017, p.700)。

MM アルゴリズムは、この最適な変分事後分布とパラメタ Ψ の更新を交互に行うというステップから成る。具体的には、以下の手続きを踏む。

1. 初期値 $\Psi^{(0)}$ を決定する、反復数カウンタを $m = 1$ とする。

2. 第 1 M ステップ（変分分布の更新）： $q_i(\theta_i)^{(m)}, q_j(d_j)^{(m)} \leftarrow \arg \max_{q_i(\theta_i), q_j(d_j)} \underline{l}(\mathbf{X}; q_i(\theta_i), q_j(d_j), \Psi^{(m-1)})$ と更新する。この更新は、式 (39), (40) を計算することによってなされる。
3. 第 2 M ステップ（パラメタの更新）： $\Psi^{(m)} \leftarrow \arg \max_{\Psi} \underline{l}(\mathbf{X}; q_i(\theta_i)^{(m)}, q_j(d_j)^{(m)}, \Psi)$ によって、パラメタを更新する。
4. 収束基準を満足していれば、 $\Psi^{(m)}, q_i(\theta_i)^{(m)}, q_j(d_j)^{(m)}$ を出力する。そうでなければ、 $m = m + 1$ として、ステップ 2 にもどる。

Jeon et al. (2017, p.699)にあるように、対数周辺尤度の下界 $\underline{l}(\mathbf{X}; q(\boldsymbol{\theta}, \mathbf{d}), \Psi)$ は、積分が必要な項については、 θ_i と d_j についての2重積分しか含んでおらず（式 (39), (40)を参照）、もとの対数周辺尤度 $\log p(\mathbf{X}; \Psi)$ と比較して計算量が削減できていることがわかる。Jeon et al. (2017)では、最適化に必要な最低限の積分に適応的ガウスエルミート求積（adaptive Gauss-Hermite quadrature）を用いている。また、第 2 M ステップにおいては、勾配降下法などの数値最適化のルーチンを使用できる。

Jeon et al. (2017)の VB 法と関連して、Klami (2015)は Pólya-Gamma 分布を利用して、MIRT モデルの困難度パラメタを除いたモデルで、識別力パラメタに制約のない場合の VB 法を提案している。さらに、Cho, Wang, Zhang, and Xu (2021)は、変分事後分布に正規分布を仮定した VB 法を開発し、シミュレーション研究により、有限のサンプルサイズ下では CJMLE よりもバイアスが少ないことや、MH-RM アルゴリズムより小さい平均事情誤差を示すことなどを報告した。また、一定の条件のもと、サンプルサイズと項目数が大きくなるにつれて、推定値と真値の間の誤差の期待値が 0 に近づくことも示している (Cho et al. 2021, p.61)。

VB 法の注意点を述べる。変分分布の設計は、Jeon et al. (2017)では平均場近似という方法を用いて、変分分布の族は指定しなかった。しかし、Cho et al. (2021)の方法のように変分分布をより明示的に指定して、変分分布と通常の事後分布の間のカルバック・ライブラー距離を最小化するような変分パラメタを推定する事もできる。最適化においては、やはり周辺尤度の下界を最適化するという方法を用いることで達成される。また、ハイパーパラメタの推定も同様に、周辺尤度の下界を最適化するように決定することができる。この方法を経験変分ベイズ学習と呼ぶことがある (Nakajima et al., 2019; pp. 46-47)。

4.3. 深層学習アルゴリズムの適用

前項で紹介した VB 法は平均場近似に基づいて変分分布を設計していた。しかし、個々人ごとに潜在特性の変分分布を更新するのは効率的ではない。こうした点を改良し、観測データから変分分布を予測する仕組み（amortized variational inference, AVI; 償却変分推論）を組み込んだ変分自己符号化器 variational auto encoder; VAE; Kingma & Welling, 2014; Rezende, Mohamed, & Wierstra, 2014）を用いた MIRT モデルのパラメタ推定法が、Urban and Bauer (2021)によって提案された。VAE は主成分分析などの次元削減モデルにニューラルネットワークを組み込んだ教師なしモデルであり (須山, 2019, p.148), MIRT モデルはある種の次元削減モデルであるため VAE を適用できる。VAE には、機械学習で用いられる様々なテクニックが含まれているため、ここでは VAE の主要な要素である AVI のアイデアの骨子を説明し、Urban and Bauer (2021)の方法を簡略化した形で説明する。より詳細な点は、Urban and Bauer (2021)を参照してほしい。関連する方法として、Converse, Curi, Oliveira, and Templin

(2021)も VAE による MIRT モデルのパラメタ推法を提案している。Urban and Bauer (2021)は項目反応モデルとして段階反応モデルを仮定していたが、本稿では式 (1) の 2 値反応モデルを想定する。

前項の最後に述べたように、変分分布には分析者が具体的に指定した分布族を利用することもできる。AVI では、個人ごとの変分分布として、平均ベクトルが μ_i 、分散共分散行列が $\sigma_i^2 \mathbf{I}_K$ ($\mathbf{I}_K$ は $K \times K$ の単位行列) の正規分布を仮定し

$$q(\theta_i | \mathbf{x}_i; \psi) = N(\mu_i, \sigma_i^2 \mathbf{I}_K), \quad (41)$$

さらに、これらの平均と分散を、反応データ $\mathbf{x}_i$ を入力としパラメタ集合が ψ であるニューラルネットワーク ($\text{FNN}(\mathbf{x}_i; \psi)$) からの出力とする。すなわち、

$$(\mu_i^T, \log \sigma_i^T) = \text{FNN}(\mathbf{x}_i; \psi), \quad (42)$$

とする。 $q(\theta_i | \mathbf{x}_i; \psi)$ にパラメタ ψ がついていたのはこうした理由による。さらに、すべての個人で同様の $\text{FNN}(\mathbf{x}_i; \psi)$ を仮定するため、変分パラメタが個人ごとの平均ベクトル μ_i ・分散 σ_i^2 から全員に共有されているニューラルネットワークのパラメタ ψ に変更される。なお、層の数が L であるニューラルネットワークの第 $l (= 1, \dots, L-1)$ 層 $h_i^{(l)}$ (長さ $P_l \times 1$) は、適当な非線形関数 $f^{(l)}(\cdot)$ 、重み行列 $\mathbf{W}^{(l)}$ (サイズ $P_l \times P_{l-1}$)、切片ベクトル $\mathbf{b}^{(l)}$ (長さ $P_l \times 1$) を用いて、

$$h_i^{(l)} = f^{(l)}(\mathbf{W}^{(l)} h_i^{(l-1)} + \mathbf{b}^{(l)}), \quad (43)$$

と表される。ただし、第 L 層 (出力層) と第 0 層 (入力層) は、出力ベクトル $\mathbf{y}_i$ と誤差ベクトル ϵ_i (いずれも長さ $P_L \times 1$)、と入力ベクトル $\mathbf{x}_i$ (長さ $P_0 \times 1$) を用いて、 $h_i^{(L)} = \mathbf{y}_i - \epsilon_i$, $h_i^{(0)} = \mathbf{x}_i$ と表される。先に示した、 $\text{FNN}(\mathbf{x}_i; \psi)$ のパラメタは $\psi = (\mathbf{W}^{(l)}, \mathbf{b}^{(l)})_L$ である。また、出力 $\mathbf{y}_i$ を $(\mu_i^T, \log \sigma_i^T)$ という変分分布の平均と分散とするのが、AVI の発想である。これにより、入力 $\mathbf{x}_i$ を適当に非線形変換を加えたものを用いて、 $(\mu_i^T, \log \sigma_i^T)$ を予測する柔軟なモデルが得られたことになる。このような、変分パラメタを予測するニューラルネットワークは推論ネットワーク (inference network) あるいは認識ネットワーク (recognition network) と呼ばれる (須山, 2019, p.150)。

このような設定のもと、VAE では、項目パラメタの集合 ξ と変分パラメタ ψ を推定するために、変分分布を $q(\theta | \mathbf{X}; \psi) = \prod_i q(\theta_i | \mathbf{x}_i; \psi)$ とあらわし、

$$\text{KL}(q(\theta | \mathbf{X}; \psi) || p(\theta | \mathbf{X}, \xi)), \quad (44)$$

を最小化する問題を考える。この問題と等価な問題として、

$$\underline{l}(\mathbf{X}; q(\theta | \mathbf{X}; \psi), \xi) = \underline{l}(\psi, \xi) = \mathbb{E}_{q(\theta | \mathbf{X}; \psi)} [\log p(\mathbf{X}, \theta; \xi) - \log q(\theta | \mathbf{X}; \psi)], \quad (45)$$

という対数周辺尤度の下界を最大化する問題を扱うこととする。この対数周辺尤度の下界を用いて、 $\underline{l}(\psi, \xi)$ を ξ と ψ について微分し、勾配降下法によりパラメタを最適化することで、目的が解決される。Urban and Bauer (2021) はさらに、重要度重み付き変分推論 (importance-weighted variance inference; Burda, Grosse, & Salakhundinov, 2016) を用いて、より真の対数周辺尤度に近い下界を用いて近似の精度を高める工夫や、ミニバッチを用いた確率的最適化と AMSGrad と呼ばれる方法でパラメタの更新を行う最適化のプロセスの工夫も行っている。これにより、前述の MH-RM アルゴリズムや CJMLE アルゴリズムよりも推定時間が短くなることをシミュレーションで示した。

$\underline{l}(\psi, \xi)$ の項目パラメタ ξ と変分パラメタ ψ についての微分を評価する方法について補足を行う。 $\underline{l}(\psi, \xi)$ の ξ の勾配の評価は、 $q(\theta | \mathbf{X}; \psi)$ からの S 個のモンテカルロ標本 $(\theta^{(1)}, \dots, \theta^{(S)}, \dots, \theta^{(S)})$ を使った期待値の近似を行うことにより

$$\frac{\partial}{\partial \xi} \underline{l}(\psi, \xi) = \frac{\partial}{\partial \xi} \mathbb{E}_{q(\theta | \mathbf{X}; \psi)} [\log p(\mathbf{X}, \theta; \xi) - \log q(\theta | \mathbf{X}; \psi)],$$

$$= \mathbb{E}_{q(\boldsymbol{\Theta}|\mathbf{X}; \boldsymbol{\Psi})} \left[\frac{\partial}{\partial \boldsymbol{\xi}} \log p(\mathbf{X}, \boldsymbol{\Theta}; \boldsymbol{\xi}) \right] \approx \frac{1}{S} \sum_{s=1}^S \frac{\partial}{\partial \boldsymbol{\xi}} \log p(\mathbf{X}, \boldsymbol{\Theta}^{(s)}; \boldsymbol{\xi}), \quad (46)$$

と評価できる。式 (46) の 1 行目では、期待値を取る分布に項目パラメタ $\boldsymbol{\xi}$ が含まれていないため、期待値と微分の交換ができる。変分パラメタ $\boldsymbol{\Psi}$ の微分のためには、再パラメタトリック (reparameterization trick) を使って、期待値をとる分布に $\boldsymbol{\Psi}$ が含まれないようにする。具体的には、

$$\boldsymbol{\theta}_i = \boldsymbol{\mu}_i + \boldsymbol{\sigma}_i \odot \boldsymbol{\epsilon}, \boldsymbol{\epsilon} \sim N(\mathbf{0}_K, \mathbf{I}_K), \quad (47)$$

と再パラメタ化する。ここで、 $\mathbf{0}_K$ は長さ K で要素がすべて 0 のベクトルとし、演算 $\odot$ は要素ごとの掛け算を意味していて、 $\boldsymbol{\epsilon}$ は標準多変量正規分布から得られる確率変数である。これにより、 $l(\boldsymbol{\Psi}, \boldsymbol{\xi})$ の $\boldsymbol{\Psi}$ についての勾配は、先のモンテカルロ法と組み合わせて、

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial \boldsymbol{\Psi}} l(\boldsymbol{\Psi}, \boldsymbol{\xi}) &= \frac{\partial}{\partial \boldsymbol{\Psi}} \mathbb{E}_{N(\mathbf{0}_K, \mathbf{I}_K)} [\log p(\mathbf{X}, \boldsymbol{\Theta}; \boldsymbol{\xi}) - \log q(\boldsymbol{\Theta}|\mathbf{X}; \boldsymbol{\Psi})], \\ &= \mathbb{E}_{N(\mathbf{0}_K, \mathbf{I}_K)} \left[\frac{\partial}{\partial \boldsymbol{\Psi}} \log p(\mathbf{X}, \boldsymbol{\Theta}; \boldsymbol{\xi}) - \frac{\partial}{\partial \boldsymbol{\Psi}} \log q(\boldsymbol{\Theta}|\mathbf{X}; \boldsymbol{\Psi}) \right], \\ &\approx \frac{1}{S} \sum_{s=1}^S \left[\frac{\partial}{\partial \boldsymbol{\Psi}} \log p(\mathbf{X}, \boldsymbol{\Theta}^{(s)}; \boldsymbol{\xi}) - \frac{\partial}{\partial \boldsymbol{\Psi}} \log q(\boldsymbol{\Theta}^{(s)}|\mathbf{X}; \boldsymbol{\Psi}) \right], \end{aligned} \quad (48)$$

となる。 $q(\boldsymbol{\Theta}^{(s)}|\mathbf{X}; \boldsymbol{\Psi})$ はニューラルネットワークの関数であるので、この微分の評価には、標準的な誤差伝播法などを用いることができる。

Urban and Bauer (2021) の方法には正則化推定を組み合わせることができる。正則化推定について、MIRT モデルの文脈では、例えば、Battauz (2020) は多次元名義反応モデルに対する正則化推定を提案し、識別力パラメタおよび困難度パラメタの推定において、MLE よりも正則化推定のほうがバイアスや平均二乗誤差が小さいことを示した。さらに、Battauz and Bellio (2021) は、3 パラメタロジスティック IRT モデルに対して、リッジ正則化とそのバイアス減少補正を行った正則化推定法を提案している。こうした正則推定法を対数周辺尤度の下界の最適化の際に応用することができるだろう。

5. Generalized Fiducial inference による推測

前節で概観してきたベイズ統計学的方法は、よく指摘されるように、事前分布の選択の難しさも有している。Liu and Hannig (2016) は式 (1) で定義される高次元の MIRT モデルの積分問題に対応しつつ、事前分布の選択の困難を回避する推定法として、一般化フィデューシャル推測 (GFI) を提案した。さらに、Liu and Hannig (2017) は段階反応モデルに GFI を拡張した。

Liu and Hannig (2016) によると、パラメタのフィデューシャル分布はデータ依存事前分布を用いたベイズ的事後分布によってよく近似されるものであり、Bernstein-von Mises 型の漸近正規性を満たすものである。さらに、フィデューシャル分布による信頼区間は、シミュレーションによって、小さいサンプルサイズのもとでも Wald 統計量による信頼区間より妥当で短いということが示されている。

本節では、こうした特徴を持つ GFI について簡単に紹介し、MIRT モデルへの応用について紹介する。なお、本稿では確率の解釈やデータからパラメタを推測するとはどういうことか、といった哲学的な議論には立ち入らない。また、GFI の記法や定義など論文により差異があるが、ここでは Liu & Hannig (2016) のものを用いる。さらに、GFI と近似ベイズ計算 (approximate Bayesian computation; ABC) との類似性についての議論や比較的使いやすい一般化フィデューシャル分布の定義や理論的成果については、Hannig et al. (2016) に詳しい。Fisher のオリジナルのフィデューシャル推測についての歴史は Hannig (2009) や Zabell (1992) などに記述がある。

まず、通常のフィデューシアル推測の発想を簡単な例により示す。まず、データ Y が未知の母平均 $\zeta \in \mathbb{R}$ と既知の母分散 $\sigma^2 = 1$ をもつ正規分布 $N(\zeta, 1)$ に従っているとす。もし、真の母平均 $\zeta = \zeta_0$ が既知であれば、データが $Y = \zeta_0 + U, U \sim N(0, 1)$ に従って生成されると表現できる。さらに、データが実際に観測されて $Y = y$ であるとわかったあとに、 ζ_0 について推測したいとする。普通の場合では $y = \zeta_0 + u_0$ を満足するような真の誤差の値 $U = u_0$ を同定できないが、もしできたとすると $\zeta_0 = y - u_0$ によって真のパラメタを復元できる。しかし、現実にはそれは不可能である。そこで、 $y - u$ という統計量について、固定された u を、データ生成のための U と独立同一の分布に従う複製（これを U^* とする）に置き換えることを考える。これにより、 $y - U^*$ という統計量を構成でき、これは平均が y で分散が1の正規分布に従うことがわかる。この分布を ζ のフィデューシアル分布とよぶ。フィデューシアル分布はそれぞれの ζ における y を生成するもっともらしさ（plausible）を評価していると考えられている。このように、フィデューシアル推測はモデルとデータ以外の情報を利用していない点が特徴である。

GFIの一般論のために、新しくいくつかの用語を導入する。まず、パラメタ空間を Ξ とする。さらに、パラメトリックなモデルの属に対して、データ生成方程式（data-generating equation; DGE）を導入する。DGEは、パラメタ $\xi \in \Xi$ とパラメタに依存しない確率分布に従うランダム要素 U を要素にとり、データ Y を構成する可測関数である。つまり、

$$Y = g(\xi, U), \quad (49)$$

であり、 $g(\cdot, \cdot)$ がDGEである。先程の正規分布の例では $g(\zeta, U) = \zeta + U$ である。もし、パラメタ ξ が既知であれば、式(49)と既知の分布からサンプリングされたランダム要素 U により Y が得られる。逆に、 ξ を推測するにあたり、 $Y = y$ が既知で固定されたものだとすると、式(49)はデータとランダム要素によって表される陰関数（implicit function）であると考えられる。そのため、確率空間のある分布は既知の分布を変換する形で式(49)によって暗に決定されている。つまり、式(49)を ξ について解くことでパラメタの推測のためのフィデューシアル分布が導かれる。

ここで、DGEの集合逆関数を

$$Q(y, u) = \{\xi \in \Xi : y = g(\xi, u)\}, \quad (50)$$

と定義すると、これは所与の y と u に対して式(49)のありうるすべての解を含んでいる。最初の例では、 $Q(y, u) = \{y - u\}$ である。その中のユニークな要素がフィデューシアル分布（ $y - U^*$ ）である。このようなユニークな要素を決めるために、 $Q(y, u)$ からランダムに選択するなどするルールが必要となる。さらに、 $Q(y, u)$ が空集合になるケースもあり、これは特定の u に対して y を生成できるパラメタが存在しないということを意味している。しかし、モデルの特定が正しいのであれば、そのような誤差 u はパラメタ ξ を推測するためには無意味であり除去されるべきものである。そこで、式(50)が空集合ではないという要求を課す。

上記の点を踏まえて、フィデューシアル分布は、

$$v(Q(y, U^*)) | \{Q(y, U^*) \neq \emptyset\}, \quad (51)$$

と定義され、 U^* はデータ生成のための U と独立同一に分布に従う複製であり、 $v(\cdot)$ は要素を選択するルールである。フィデューシアル分布についての注意として、DGEと要素の選択ルールが異なれば、異なった分布を導くという事が挙げられる。

このようなGFIの一般論をMIRTモデルに適用する。式(1)において、 θ_i を $N(\mathbf{0}_K, \mathbf{I}_K)$ に従う確率変数 $\tilde{\theta}_i$ の実現値とする。項目反応 X_{ij} が成功確率 $P(X_{ij} = 1 | \theta_i, \mathbf{a}_j, d_j)$ のベルヌイ分布に従う確率変数であることから、 X_{ij} のDGEは

$$\begin{aligned} X_{ij} &= \mathbb{I}(U_{ij} \leq P(X_{ij} = 1 | \tilde{\theta}_i = \theta_i, \mathbf{a}_j, d_j)) = \mathbb{I}(\text{logit}(U_{ij}) \leq d_j + \mathbf{a}_j^\top \tilde{\theta}_i), \\ &= \mathbb{I}(C_{ij} \leq d_j + \mathbf{a}_j^\top \tilde{\theta}_i), \end{aligned} \quad (52)$$

である。 U_{ij} は $\tilde{\theta}_i$ とは独立の、0 から 1 の一様分布に従う確率変数であり ($U_{ij} \sim \text{Unif}(0,1)$) , $C_{ij} = \text{logit}(U_{ij})$ はパラメタが 0, 1 のロジスティック確率変数に従う確率変数である ($C_{ij} \sim \text{Logistic}(0,1)$) 。また、 c_{ij} を C_{ij} の実現値とする。ここでは、項目パラメタ $\{d_j, \mathbf{a}_j\}$ が DGE のパラメタ ξ であり、 $\tilde{\theta}_i$ および C_{ij} は未知のパラメタを含まない分布から得られるランダム要素である。ここから、式 (52) の集合逆関数は、

$$Q_{ij}(x_{ij}, c_{ij}, \theta_i) = \left\{ \xi_j \in \mathbb{R}^{q_j}: \begin{array}{l} c_{ij} \leq d_j + \mathbf{a}_j^\top \theta_i, \text{ if } x_{ij} = 1, \\ c_{ij} > d_j + \mathbf{a}_j^\top \theta_i, \text{ if } x_{ij} = 0 \end{array} \right\}, \quad (53)$$

となる。 q_j は項目 j のパラメタ数である。さらに、 $\mathbf{c} = (c_{ij})_{i \times j}$ という集合を考えると DGE の逆集合は、

$$Q(\mathbf{X}, \boldsymbol{\theta}, \mathbf{c}) = \bigotimes_{j=1}^J \bigcap_{i=1}^I Q_{ij}(x_{ij}, c_{ij}, \theta_i), \quad (54)$$

である。ただし“ $\otimes$ ”は直積を表しているとする。今回の設定では項目パラメタは複数の項目で共有されていないと仮定しているため、直積を取ることができる。さらに、 $\bigcap_{i=1}^I Q_{ij}(x_{ij}, c_{ij}, \theta_i)$ の部分から、項目 j のパラメタは I 人分の集合逆関数の共通集合からなっており、これは式 (53) から q_j 次元の多面体の閉包であることがわかる ($d_j + \mathbf{a}_j^\top \theta_i$ が超平面をなしていることから理解できる)。これらを用いて、 $\tilde{\boldsymbol{\theta}}^*$ と $\mathbf{c}^*$ をそれぞれ $\tilde{\boldsymbol{\theta}} = (\tilde{\theta}_i)_I, \mathbf{c} = (c_{ij})_{I \times J}$ の i.i.d.の複製とすると、MIRT モデルの項目パラメタのフィデューシャル分布は、

$$\mathbf{v}\left(Q(\mathbf{X}, \tilde{\boldsymbol{\theta}}^*, \mathbf{c}^*)\right) | \{Q(\mathbf{X}, \tilde{\boldsymbol{\theta}}^*, \mathbf{c}^*) \neq \emptyset\}, \quad (55)$$

で与えられる。式 (55) の分布は、 $Q(\mathbf{X}, \tilde{\boldsymbol{\theta}}^*, \mathbf{c}^*)$ が空集合にならないように、MCMC によって $\tilde{\boldsymbol{\theta}}^*$ と $\mathbf{c}^*$ をサンプリングすることで、数値的に実現される。以上が Liu and Hannig (2016)の方法である。

6. 潜在特性パラメタの推定

MIRT モデルの潜在特性パラメタの推定法については、MLE による漸近分布が多次元正規分布であることが示されているものの (Sinharay, 2015) , Psychometrika 誌においては一次元ロジスティック型 IRT モデルの潜在特性パラメタの推定における不確実性を評価する研究が散見されたため、本節ではそれらの研究を概観する。現実のテスト利用場面においては、潜在特性パラメタを推定するためのテスト・尺度項目の数は必ずしも多くなく、また、真の潜在特性パラメタが極端な値の場合にはフィッシャー情報量の逆数を用いた漸近的な信頼区間は必ずしも正確ではないため、潜在特性パラメタの正確な推定精度を評価することが問題となる。さらに、潜在特性パラメタの分布推定量 (distribution estimator) を得る方法は、ベイズ統計学的方法に限定されているという問題もある。以下では、こうした問題を解決するための信頼区間を改善する方法や新しい観点からの信頼区間の構成方法を概観する。

6.1. 古典的な信頼区間の改善

Magis (2016)は、Magis (2014)の方法を発展させて、伝統的な MLE や MAP, WL (weighted likelihood method; e.g., Tao, Shi, & Chang, 2012) , ロバスト推定法 (Schuster & Yuan, 2011) を包含する推定法に対して、統一的な漸近分散を与える公式を提案した。Magis (2016)の方法は、テイラー展開の 1 次近似を用いることで、それまで提案されてきた漸近的信頼区間の構成で用いられてきた複雑なキュムラントを用いることなく比較的簡潔でありながら、正確な方式である。より具体的には、 $G_j(\theta) =$

$\sum_{j=1}^J g_j(\theta, J) / J$ と書ける関数に対して、 $G'_j(\hat{\theta}) = 0$ を満たす、潜在特性の推定量 $\hat{\theta}$ のクラスを対象とした。ここで、 $g_j(\theta, J) = f_j(\theta)X_j + t_j(\theta, J)$ であり、 $f(\theta)$ は θ の関数で、 $t(\theta, J)$ は θ とテスト長 J の関数である。Magis (2016, p.186)で示されている仮定のもと、漸近的な標準誤差の推定値は $f_j(\theta)$ と $t_j(\theta, J)$ の θ についての一階微分と項目反応関数を用いた比較的単純な式で求められることを示した (Magis, 2016, p.188, 式 16 参照)。MLE, MAP, WL, ロバスト推定に対する具体的な公式は、Magis (2016) の p.189 の Table 1 にまとめられている。さらに、正確な標準誤差を計算可能な Rasch モデルを用いたシミュレーションにより、新たに提案した MAP と WL の漸近標準誤差の推定値を評価し、伝統的な方法よりも小さいバイアスと平均二乗誤差を示すことを示した。

また、Doebler, Doebler, and Holling (2013)は、これまでの信頼区間の構成が漸近的な方法であり項目数が少ないときに不適切であるという問題意識をもち、モデルの設定が正しく項目パラメタの真の値がわかっている状況において、テストの長さが短いときでも、被覆確率が所与の有意水準を下回らないという意味で正確な信頼区間の構成法を示した。

6.2. Second order Matching prior を利用した信頼区間の改善

Liu, Hannig, and Majumder (2019)は、Doebler et al. (2013)と同様の問題意識を持ち、確率マッチング事前分布 (probability matching prior; e.g., Ghosh, 2011; Ong & Mukerjee, 2010)を用いて、高次の精度を持つデータに依存した事前分布の構成方法を提案した。潜在特性パラメタの真値 θ_0 の漸近的な信頼区間について、データ $\mathbf{X}$ の上側信頼限界 $C_\alpha(\mathbf{X})$ に対して、名義的な信頼水準 $\alpha \in (0, 1)$ である片側信頼区間 $(-\infty, C_\alpha(\mathbf{X}))$ が r 次オーダーのマッチング (r は整数) であるとは、任意の α について $P_{\theta_0}(\theta_0 \leq C_\alpha(\mathbf{X})) = \alpha + o(J^{-r/2})$ が成立することである。ここで、 $o(J^{-r/2})$ は、 $J^{-r/2}$ よりも速く 0 に近づく項である。通常のカイニッシュ情報量の逆数に基づく方法が 0 次のオーダー ($o(1)$)、Jeffreys の事前分布 (フィッシャー情報量の平方根に比例する事前分布) を用いた場合は 1 次のオーダー ($o(J^{-1/2})$)、提案手法は、Jeffreys の事前分布を補正する形であり、2 次のオーダー ($o(J^{-1})$) となることを示した。これにより、少ない項目数の場合でも、通常の場合より正確な信頼区間が構成できるようになった。

6.3. Rasch モデルにおける信頼分布による点推定・信頼区間の構成

Veronese and Melilli (2021)は、満点やゼロ点といった極端な得点の場合に MLE が適用できない問題に取り組むために、Rasch モデルの潜在特性パラメタの信頼分布 (confidence distributions; CD; e.g., Singh, Xie, & Strawderman, 2005; Xie & Singh, 2013; Xie, Singh, & Strawderman, 2011) を提案した。CD は、潜在特性パラメタの分布推定量であり、漸近的に CD の満たすべき性質を満足する分布推定量は漸近的 CD (asymptotical CD; aCD) とよばれる。CD はベイズ統計的な方法とは異なっており、純粋に頻度論的な観点から構成されたものであるとされている。さらに、先に示した GFI もデータに依存したパラメタ空間での分布を構成する方法であるが、CD は GFI とはまた異なった観点からの方法である。Veronese and Melilli (2021)は、Rasch モデルが自然指数分布属 (natural exponential family) として表せることに着目して、自然指数分布属に対する aCD の結果を用いて、潜在特性パラメタの aCD を定義した。CD の導入により、満点やゼロ点の場合であっても、潜在特性パラメタの推定とその信頼区間の構成ができるようになった。

7. 総括と今後の展望

7.1. Psychometrika 誌における IRT モデルのパラメタ推定研究の流れ

本研究では、2010 年から 2021 年に出版された Psychometrika 誌に掲載された MIRT モデルを中心としたパラメタ推定法の展開を概観した。近年の MIRT モデルのパラメタ推定法では、潜在特性パラメ

タの高次元化による計算量の増大により通常のガウス求積のようなナイーブな数値多重積分法では破綻してしまう計算を避ける工夫が数多くなされていた。特に、乱数を積極的に用いたモンテカルロ近似や、事後分布を制約することによる近似など、最適化計算を効率的に行うための近似を用いることにより現実的な計算量を実現する工夫がみられた。さらに、サンプルサイズ、項目数の2重の極限を考える新しい漸近的な理論の登場が機械学習の方法や新しい最適化アルゴリズムなどの導入を触発したといえる。また、GFIなど新しい観点からの推定法の提案があり、MLE・ベイズ推定以外の方法もみられた。潜在特性パラメタについては、項目数が少ないもとでの推定精度の評価が主要な関心であり、標準誤差の推定精度を高めるためのデータ依存の事前分布の利用や信頼分布といった道具立てがみられ、数理統計学の知見の積極的な応用がみられた。

第3～5節でレビューを行った推定法は、大まかにMLE的方法、ベイズ的方法に加えて、フィデューシヤル推測という古くて新しい観点からの方法であった。先に示したように、いずれの方法も、潜在特性数が多い場合（例えば $K \geq 5$; e.g., H. Zhang, Chen, and Li, 2020, p.360）のMIRTモデルにおける多重積分の困難に対処するための方法であった。特異値分解による方法は、特定の識別力パラメタに制約をかけることが難しいものの、計算速度の速さは特出しており、探索的MIRTに適した方法である。MH-RMアルゴリズムやCJMLE, Urban and Bauer (2021)によるVAEに基づく方法は探索的・確認的MIRTのどちらにも利用できる。Pólya-Gamma分布によるGibbsサンプリングとGFIはどちらも乱数を用いて、事後分布あるいは一般化フィデューシヤル分布を近似しているため、探索的MIRTモデルよりも確認的MIRTモデルへの適用が行いやすい。Jeon et al. (2017)のMMアルゴリズムは、本研究で主に対象としたMIRTモデルよりも、共変量を含む、識別力パラメタを1に固定し多数の潜在特性パラメタ（個人の変量効果）と項目の変量効果を含むIRTモデルに適している。

計算速度に関しては、特異値分解による方法が最速であり、Urban and Bauer (2021)の方法はCJMLEよりも早く、CJMLEは、MH-RMアルゴリズムよりかなり高速であるというシミュレーション結果が報告されている。ただし、推定精度においては、特異値分解による方法とCJMLEはMH-RMアルゴリズムに若干劣る点に注意が必要である。また、Urban and Bauer (2021)の方法は、サンプルサイズ・項目数が小さい場合はCJMLEより若干低い平均二乗誤差を示し、同程度の計算速度であることが示されている。サンプルサイズ・項目数が大きい条件ではCJMLEのほうが低い平均二乗誤差を示しているものの、CJMLEのほうが圧倒的に計算に時間がかかっている（Urban & Bauer, 2021, p.23）。また、Urban and Bauer (2021)の方法とMH-RMアルゴリズムの比較では、Urban and Bauer (2021)の方法のほうが小さい平均二乗誤差を示し、計算速度が速いという結果を示している（Urban & Bauer, 2021, p.21）。こうした結果から、MLEベースの方法では推定速度と精度のトレードオフの関係がみられるが、Urban and Bauer (2021)の方法は高速な計算と推定精度を両立している。ただし、Urban and Bauer (2021)の方法はPython言語の機械学習ライブラリPyTorch (Paszke et al., 2019)で実装されているため、Pythonに習熟していない場合は利用しにくいと思われる。推定精度と速度およびパッケージの利用の容易さのバランスで言えば、CJMLEが有用であると考えられる。ただし、推定法の選択は、データのサイズと利用できる計算資源にも依存する。もし十分高速な計算機が利用できるのであれば、推定精度の観点からはMH-RMアルゴリズムの利用が望ましいだろう。

Pólya-Gamma分布によるGibbsサンプリングとGFIはどちらも乱数を用いて、データを得たもとのパラメタの分布を近似する方法であり、推定時間が長くなってしまうという欠点がある。しかし、サンプルサイズが小さい場合、Pólya-Gamma分布によるGibbsサンプリングは古典的なMHアルゴリズムよりも小さいバイアスや自己相関を与え、GFIも適切な被覆率を保証しつつMplusで計算可能なWald信頼区間より短い信頼区間を与えるなどの有効性を示している。一般にサンプルサイズが小さい場合にはベイズ統計の方法がMLEよりも安定した推定結果を与えるという点もふまえて考えると、サンプルサイズが小さい場合は、ベイズ推定法やGFIを用いて、サンプルサイズが大きい場合には、CJMLEなど計算効率がよい方法が望ましいと考えられる。ベイズ推定法とGFIの比較について、

Cisewski and Hannig, (2012)は線形混合モデルにおいて、シミュレーションにより GFI とベイズ推定法を比較し、GFI はサンプルサイズが小さい場合の信頼区間の被覆率と信頼区間の平均的長さにおいて、他の手法と同程度かよいということを報告している。こうした知見から、MIRT モデルのパラメタ推定においても、GFI がベイズ推定法よりも安定した推定が可能であると期待できるため、今後より詳細な比較検討が望まれる。Jeon et al. (2017)の MM アルゴリズムは、MCMC によるパラメタ推定よりも早く、ラプラス近似による事後分布の近似よりも正確であることが示されているが、その定式化から、通常の IRT モデルが用いられる文脈というよりも、一般化線形混合モデルが用いられるような、調査・実験研究データに用いることが好ましいだろう。

7.2. 今後の研究の展望

これまでの研究を踏まえて、項目反応理論におけるパラメタ推定法や適用の可能性についての今後の展望を述べる。具体的には、計算の高速化、アルゴリズムの理論的性質の解明、単純構造を得るためのパラメタ推定法、リンキング・等化、拡張モデルへの応用、多次元潜在特性の推定精度の評価、予測の観点からの潜在特性の推定方法について議論を行う。

これまでの研究として、MIRT モデルの推定に関わる積分計算の負荷を避けるアルゴリズムが多数提案されていることが明らかとなった。これにより、潜在特性数が多い場合の MIRT モデルのパラメタ推定の主要な問題であった多次元の積分問題は、実用の範囲ではほぼ解決がなされたと考えて良いだろう。しかし、推定の精度を向上させつつ、さらなる推定の高速化に向けた研究も続くと考えられる。MH-RM アルゴリズムは潜在特性パラメタの期待値計算と項目パラメタの最適化のそれぞれに計算の工夫ができることを示し、JMLE は潜在特性・項目パラメタのそれぞれの最適化の可能であるということを示した。今後はこうした個別のステップに対して効率的な最適化計算の新しい方法が適用され推定の高速化が更に実現されると予想される。

ただし、こうした推定アルゴリズムがどれほど速い収束を示すのかといった理論的な検討はこれまであまり行われていない。シミュレーション研究の推定時間は使用したプログラミング言語にも大きく左右される。そのため、シミュレーションによる推定時間の比較のみならず、鈴木 (2015) で詳細に解説されている確率的最適化の理論を援用することなどにより、推定アルゴリズムの収束速度に関する理論的な性質の解明が望まれる。さらに、Urban and Bauer (2021)の方法や Jeon et al. (2017)の MM アルゴリズムでは近似的な事後分布を用いた推定を行っているが、そうした方法の周辺尤度の近似の良さとパラメタ推定の良さ、あるいは予測の良さなどの理論的な評価は今後検討する必要がある。こうした近似精度の評価は Nakajima et al. (2019)の VB 法における一般理論を用いて解決ができる可能性がある。

さらに、探索的 MIRT モデルでは、探索的因子分析と同様に、潜在特性数も未知の要素であることに加えて、識別力パラメタ行列の解釈性を向上させるための因子の回転という操作も必要となる。しかし、MIRT の文脈で、多数の潜在変数が想定される場合に、因子数を同定しつつ、パラメタ推定と回転による識別力パラメタ行列の単純構造を同時に得る方法は未だ十分には検討されていない。因子分析の文脈では、潜在特性数、識別力行列の単純構造およびパラメタ推定を同時に行う方法が提案されており (Ročková & George, 2016)、こうした方法を探索的 MIRT モデルに適用することも可能かもしれない。

この他、MIRT モデルにおけるリンキングや等化も重要な関心事項であり検討の余地があるだろう。Usami, Murayama, and Hamaker (2019)において包括的に検討されているように、縦断データ解析における交差遅延モデルやその発展モデルでは、複数の変数の間の時系列的な変化を対象にすることがしばしばある。1次元 IRT モデルを用いたリンキングのように、MIRT を用いるような文脈において、異なった版のテストの間の複数の潜在特性パラメタを比較可能にすることに加えて、複数の潜在特性パラメタの発達的变化を測定し、交差遅延モデルや関連モデルを利用するためには、こうした MIRT モ

デルでのリンキングや等化の技法が必要になると思われる。von Davier and von Davier (2007)は一次元 IRT モデルのリンキングの方法を、ラグランジュ未定乗数法を応用した尤度関数の最適化問題として定式化しており、この方法は MIRT モデルの文脈で活用できる可能性がある。すなわち、MIRT モデルのパラメタ推定法を用いて、ラグランジュ未定乗数法を用いた制約付き最適化問題を解くことで、パラメタ推定とリンキングを同時に実行するというアプローチが考えられる。

また、高次の階層構造を考えることにより、変量効果項が増える状況への対応も今後検討の必要がある。本レビューで用いた方法の拡張や機械学習による方法により計算量の削減を図りつつパラメタの推定を行う枠組みの発展により、より現実に即した形で様々な IRT モデルの適用が期待できる。つまり、こうした計算量の削減の工夫は、大規模・複雑なテストデータでその有用性が発揮され则认为えられる。例えば、反応時間、テスト解答行動の履歴などのデータの活用の可能性や、プロセスデータの収集も可能となってきた（Tang, Zhang, Wang, Liu, & Ying, 2021）という点に鑑みて、現実的な計算量で、多数の潜在変数を扱うことができるような MH-RM アルゴリズムや VB 法は、今後もある可能性が高い。さらに、MIRT とボルツマンマシン（Boltzmann machine）の同値性がすでに指摘されており（Maris & Bechger, 2000）、MIRT のモデルを機械学習モデルとして解釈することで、機械学習領域の様々な方法論を適用可能になると考えられる。こうした観点は、今後の研究の一つの方向性を示している。今後の研究課題としては MIRT モデルそれ自体のパラメタ推定問題よりも、例えば 4 パラメタ IRT モデルやマルチレベル IRT のモデルなど拡張されたモデルのパラメタ推定や Rasch モデルなど特殊なモデル特有の問題への対応が残されていると思われる。

さらに、本研究でレビューした潜在特性パラメタの推定法は一次元 IRT モデルを前提としている一方で、MIRT モデルのもとでの潜在特性パラメタの推定法は今後の発展の余地があると考えられる。特に、MLE ベースの信頼領域の推定については、本研究でレビューした方法を発展させることでその精度の向上が期待できる。ただし、潜在特性パラメタの信頼区間の構成について、本研究でレビューをおこなった手法はモデルが正しく、項目パラメタが既知であるという前提で導出された成果である、という点には注意が必要である。そのため、項目パラメタが未知である場合には、例えば、Hoshino and Shigemasu (2008)の項目パラメタを推定する際の不確実性も含めた潜在特性パラメタの標準誤差を評価する方法と本研究でレビューした手法を組み合わせることで、一つのデータセットを用いて項目パラメタの推定と潜在特性パラメタを段階的に推定するような場面でも、より正確な標準誤差を利用できるようになると考えられる。また、モデルが正しくないときの潜在特性パラメタの推定における頑健な信頼区間の構成方法なども必要かもしれない。

さらに、潜在特性パラメタが当該テスト以外のテストスコアを予測するためにも利用できるパラメタと考えれば、そうした予測の観点で最適な値をパラメタの推定値することが考えられる。これは、予測推定量（predictive estimator; e.g., Ogasawara, 2017）とも関連する考え方で、予測推定量は期待対数尤度を現在のデータと将来のデータの両方にわたって最適化する推定量である。このような、将来のデータの予測を考慮するという観点は IRT の文脈ではほとんど考察されていない。Schofield, Junker, Taylor, and Black (2015)は、潜在変数と共変量を用いた予測の観点を導入しており、この考え方を発展させた推定法の発展が期待される。このほか、Casabianca and Lewis (2015)は潜在特性の分布を対数線形平滑化（loglinear smoothing）を用いてモデル化した EM アルゴリズムによる項目パラメタの推定法を提案しており、こうした方法は、事前分布を柔軟に表現する方法としても利用できるかもしれない。なお、Casabianca and Lewis (2015)の方法は、潜在特性パラメタの分布が正規分布ではなく歪んだ分布や多峰性のある分布場合であっても、バイアスが小さい推定値が得られることが報告されている。

最後に、本研究ではレビューの主な対象を Psychometrika 誌に限定していたため、IRT モデルのパラメタ推定展開を網羅的に検討できていないわけではない。今後は、レビューの対象を広げ、より網羅的な IRT のモデルのパラメタ推定の動向を検討することも必要であろう。また、シミュレーションによ

って、本研究でレビューを行った推定法の包括的な比較を行うことも、推定法の選択を行う上では有用であり、今後検討する必要がある。

謝辞

本研究は JSPS 科研費 19H00616, 20H01720, 21H00936 の助成を受けたものです。

引用文献

- Adachi, K. (2012). Some contributions to data-fitting analysis with empirical comparisons to covariance-fitting factor analysis. *Journal of the Japanese Society of Computational Statistics*, 25(1), 25–38. https://doi.org/10.5183/jjscs.1106001_197
- Adachi, K. (2016). *Matrix-based introduction to multivariate data analysis*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-981-10-2341-5>
- 足立 浩平・村上 隆 (2011). 非計量多変量解析法—主成分分析から多重対応分析へ— 朝倉書店.
- Albert, J. H. (1992). Bayesian estimation of normal ogive item response curves using Gibbs sampling. *Journal of Educational Statistics*, 17(3), 251–269. <https://doi.org/10.3102/10769986017003251>
- Albert, J. H., & Chib, S. (1993). Bayesian analysis of binary and polychotomous response data. *Journal of the American Statistical Association*, 88(422), 669–679. <https://doi.org/10.2307/2290350>
- Asparouhov, T., & Muthén, B. (2021). Expanding the Bayesian structural equation, multilevel and mixture models to logit, negative-binomial, and nominal variables. *Structural Equation Modeling*, 28(4), 622–637. <https://doi.org/10.1080/10705511.2021.1878896>
- Baker, F. B., & Kim, S.-H. (2004). *Item response theory: Parameter estimation techniques (2nd ed.)*. CRC press.
- Battaaz, M. (2020). Regularized estimation of the nominal response model. *Multivariate Behavioral Research*, 55(6), 811–824. <https://doi.org/10.1080/00273171.2019.1681252>
- Battaaz, M., & Bellio, R. (2021). Shrinkage estimation of the three-parameter logistic model. *British Journal of Mathematical and Statistical Psychology*, 74(3), 591–609. <https://doi.org/10.1111/bmsp.12241>
- Béguin, A. A., & Glas, C. A. W. (2001). MCMC estimation and some model-fit analysis of multidimensional IRT models. *Psychometrika*, 66(4), 541–561. <https://doi.org/10.1007/BF02296195>
- Birnbaum, A. (1968). Some latent trait models and their use in inferring an examinee's ability. In F. M. Lord & M. R. Novick (Eds.), *Statistical Theories of Mental Test Scores*. Reading, MA: Addison-Wesley.
- Bishop, M. (2006). *Pattern recognition and machine learning*. Springer. <https://doi.org/10.1641/B580519>
- Blei, D. M., Kucukelbir, A., & McAuliffe, J. D. (2017). Variational inference: A review for statisticians. *Journal of the American Statistical Association*, 112, 859–877. <https://doi.org/10.1080/01621459.2017.1285773>
- Bock, R. D., & Aitkin, M. (1981). Marginal maximum likelihood estimation of item parameters: Application of an EM algorithm. *Psychometrika*, 46, 443–459. <https://doi.org/10.1007/BF02293801>
- Bock, R. D., Gibbons, R., & Muraki, E. (1988). Full-information item factor analysis. *Applied Psychological Measurement*, 12(3), 261–280. <https://doi.org/10.1177/014662168801200305>
- Bock, R. D., & Lieberman, M. (1970). Fitting a response model for n dichotomously scored items. *Psychometrika*, 35(2), 179–197. <https://doi.org/10.1007/BF02291262>
- Brooks, S., Gelman, A., Jones, G. L., & Meng, X.-L. (2011). *Handbook of Markov chain Monte Carlo*. CRC press.
- Burda, Y., Grosse, R., & Salakhutdinov, R. (2016). Importance weighted autoencoders. *4th International Conference on Learning Representations, ICLR 2016 - Conference Track Proceedings*, 1–14.
- Casabianca, J. M., & Lewis, C. (2015). IRT item parameter recovery with marginal maximum likelihood estimation using loglinear smoothing models. *Journal of Educational and Behavioral Statistics*, 40(6), 547–578. <https://doi.org/10.3102/1076998615606112>
- Cai, L. (2010). High-dimensional exploratory item factor analysis by a Metropolis–Hastings Robbins–Monro algorithm. *Psychometrika*, 75(1), 33–57. <https://doi.org/10.1007/s11336-009-9136-x>
- Chalmers, R. P. (2012). mirt: A multidimensional item response theory package for the R environment. *Journal of Statistical Software*, 48(6). <https://doi.org/10.18637/jss.v048.i06>
- Chalmers, R. P. (2015). Extended mixed-effects item response models with the MH-RM algorithm. *Journal of Educational Measurement*, 52(2), 200–222. <https://doi.org/10.1111/jedm.12072>
- Chen, J. (2020). A partially confirmatory approach to the multidimensional item response theory with the Bayesian Lasso. *Psychometrika*, 85(3), 738–774. <https://doi.org/10.1007/s11336-020-09724-3>

- Chen, Y., Li, X., & Zhang, S. (2019). Joint maximum likelihood estimation for high-dimensional exploratory item factor analysis. *Psychometrika*, 84(1), 124–146. <https://doi.org/10.1007/s11336-018-9646-5>
- Chen, P., Wang, C. (2021). Using EM algorithm for finite mixtures and reformed supplemented EM for MIRT calibration. *Psychometrika*, 86, 299–326. <https://doi.org/10.1007/s11336-021-09745-6>
- Cho, A. E., Wang, C., Zhang, X., & Xu, G. (2021). Gaussian variational estimation for multidimensional item response theory. *British Journal of Mathematical and Statistical Psychology*, 74(S1), 52–85. <https://doi.org/10.1111/bmsp.12219>
- Cisewski, J., & Hannig, J. (2012). Generalized fiducial inference for normal linear mixed models. *The Annals of Statistics*, 40(4), 2102–2127. <https://doi.org/10.1214/12-AOS1030>
- Converse, G., Curi, M., Oliveira, S., & Templin, J. (2021). Estimation of multidimensional item response theory models with correlated latent variables using variational autoencoders. *Machine Learning*, 110(6), 1463–1480. <https://doi.org/10.1007/s10994-021-06005-7>
- Culpepper, S. A. (2016). Revisiting the 4-Parameter item response model: Bayesian estimation and application. *Psychometrika*, 81(4), 1142–1163. <https://doi.org/10.1007/s11336-015-9477-6>
- De Boeck, P., & Wilson, M. (2004). *Explanatory item response models: A generalized linear and nonlinear approach*. Springer.
- Dempster, A. P., Laird, N. M., & Rubin, D. (1977). Maximum likelihood from incomplete data via the EM algorithm. *Journal of the Royal Statistical Society. Series B (Methodological)*, 39, 1–38. <https://doi.org/10.2307/2984875>
- Doebler, A., Doebler, P., & Holling, H. (2013). Optimal and most exact confidence intervals for person parameters in item response theory models. *Psychometrika*, 78(1), 98–115. <https://doi.org/10.1007/s11336-012-9290-4>
- Edwards, M. C. (2010). A Markov chain Monte Carlo approach to confirmatory item factor analysis. *Psychometrika*, 75(3), 474–497. <https://doi.org/10.1007/s11336-010-9161-9>
- Embretson, S. E., & Reise, S. P. (2000). *Item response theory for psychologists*. Erlbaum.
- Fisher, R. A. (1925). Theory of statistical estimation. *Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society*, 22(5), 700–725. <https://doi.org/10.1017/S03050004100009580>
- Fontanella, L., Fontanella, S., Valentini, P., & Trendafilov, N. (2019). Simple structure detection through Bayesian exploratory multidimensional IRT models. *Multivariate Behavioral Research*, 54(1), 100–112. <https://doi.org/10.1080/00273171.2018.1496317>
- Fox, J.-P., & Glas, C. A. W. (2001). Bayesian estimation of a multilevel IRT model using Gibbs sampling. *Psychometrika*, 66, 271–288. <https://doi.org/10.1007/BF02294839>
- Fu, Z., Zhang, S., Su, Y. H., Shi, N., & Tao, J. (2021). A Gibbs sampler for the multidimensional four-parameter logistic item response model via a data augmentation scheme. *British Journal of Mathematical and Statistical Psychology*, 74(3), 427–464. <https://doi.org/10.1111/bmsp.12234>
- Galdo, M., Bahg, G., & Turner, B. M. (2020). Variational Bayesian methods for cognitive science. *Psychological Methods*, 25(5), 535–559. <https://doi.org/10.1037/met0000242>
- Ghosh, M. (2011). Objective priors: An introduction for frequentists. *Statistical Science*, 26(2), 187–202. <https://doi.org/10.1214/10-STS338>
- Grimmer, J. (2011). An introduction to Bayesian inference via variational approximations. *Political Analysis*, 19, 32–47. <https://doi.org/10.1093/pan/mpq027>
- Hannig, J. (2009). On generalized fiducial inference. *Statistica Sinica*, 19(2), 491–544.
- Hannig, J., Iyer, H., Lai, R. C. S., & Lee, T. C. M. (2016). Generalized fiducial inference: A review and new results. *Journal of the American Statistical Association*, 111(515), 1346–1361. <https://doi.org/10.1080/01621459.2016.1165102>
- Hastie, T. (2020). Ridge regularization: An essential concept in data science. *Technometrics*, 62(4), 426–433. <https://doi.org/10.1080/00401706.2020.1791959>
- Hoshino, T., & Shigemasu, K. (2008). Standard errors of estimated latent variable scores with estimated structural parameters. *Applied Psychological Measurement*, 32(2), 181–189. <https://doi.org/10.1177/0146621607301652>
- Houts, C. R., & Cai, L. (2015). flexMIRT: Flexible multilevel multidimensional item analysis and test scoring user's manual version 3.5 RC.
- Jeon, M., & Rabe-Hesketh, S. (2012). Profile-likelihood approach for estimating generalized linear mixed models with factor structures. *Journal of Educational and Behavioral Statistics*, 37(4), 518–542. <https://doi.org/10.3102/1076998611417628>
- Jeon, M., Rijmen, F., & Rabe-Hesketh, S. (2017). A variational maximization–maximization algorithm for generalized linear mixed models with crossed random effects. *Psychometrika*, 82, 693–716. <https://doi.org/10.1007/s11336-017-9555-z>

- Jiang, Z., & Templin, J. (2019). Gibbs samplers for logistic item response models via the Pólya–Gamma distribution: A computationally efficient data-augmentation strategy. *Psychometrika*, 84(2), 358–374. <https://doi.org/10.1007/s11336-018-9641-x>
- 加藤健太郎・山田剛史・川端一光 (2014). Rによる項目反応理論 オーム社.
- Klami, A. (2015). Pólya-Gamma augmentations for factor models. In *Asian Conference on Machine Learning* (pp. 112-128). PMLR.
- Kingma, D. P., & Welling, M. (2014). Auto-encoding variational Bayes. *2nd International Conference on Learning Representations, ICLR 2014 - Conference Track Proceedings, ML*, 1–14.
- Liu, Y. (2020). A Riemannian optimization algorithm for joint maximum likelihood estimation of high-dimensional exploratory item factor analysis. *Psychometrika*, 85(2), 439–468. <https://doi.org/10.1007/s11336-020-09711-8>
- Liu, Y., & Hannig, J. (2016). Generalized fiducial inference for binary logistic item response models. *Psychometrika*, 81(2), 290–324. <https://doi.org/10.1007/s11336-015-9492-7>
- Liu, Y., & Hannig, J. (2017). Generalized fiducial inference for logistic graded response models. *Psychometrika*, 82(4), 1097–1125. <https://doi.org/10.1007/s11336-017-9554-0>
- Liu, Y., Hannig, J., & Pal Majumder, A. (2019). Second-order probability matching priors for the person parameter in unidimensional IRT models. *Psychometrika*, 84(3), 701–718. <https://doi.org/10.1007/s11336-019-09675-4>
- Lord, F. M., & Novick, M. R. (1968). *Statistical Theories of Mental Test Scores*. Addison-Wesley.
- Magis, D. (2014). On the asymptotic standard error of a class of robust estimators of ability in dichotomous item response models. *British Journal of Mathematical and Statistical Psychology*, 67(3), 430–450. <https://doi.org/10.1111/bmsp.12027>
- Magis, D. (2016). Efficient standard error formulas of ability estimators with dichotomous item response models. *Psychometrika*, 81(1), 184–200. <https://doi.org/10.1007/s11336-015-9443-3>
- Maris, G., & Bechger, T. (2000). Boltzmann machines as multidimensional item response theory models. *Journal of Machine Learning Research*, 1, 1–18. <https://doi.org/10.31234/osf.io/zjh83>
- Maris, G., Bechger, T., & Martin, E. S. (2015). A Gibbs sampler for the (extended) marginal Rasch model. *Psychometrika*, 80(4), 859–879. <https://doi.org/10.1007/s11336-015-9479-4>
- McDonald, R. R. (1999). *Test theory: A unified treatment*. Routledge.
- Meng, X., Xu, G., Zhang, J., & Tao, J. (2020). Marginalized maximum a posteriori estimation for the four - parameter logistic model under a mixture modelling framework. *British Journal of Mathematical and Statistical Psychology*, 73(S1), 51–82. <https://doi.org/10.1111/bmsp.12185>
- Muthén, L.K. and Muthén, B.O. (1998-2017). Mplus User’s Guide. Eighth Edition. Los Angeles, CA: Muthén & Muthén
- 村木英治 (2011). 項目反応理論 朝倉書店.
- Nakajima, S., Watanabe, K., & Sugiyama, M. (2019). *Variational Bayesian learning theory*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781139879354>
- Neyman, J., & Scott, E. L. (1948). Consistent estimates based on partially consistent observations. *Econometrica*, 16(1), 1–32. <https://www.jstor.org/stable/pdf/1914288.pdf?refreqid=excelsior%3Ab9d1dbc0d3d47cb3f9aecdef02be514f>
- Ogasawara, H. (2017). Predictive estimation of a covariance matrix and its structural parameters. *Journal of the Japanese Society of Computational Statistics*, 30(1), 45–63. https://doi.org/10.5183/jjcs.1706001_243
- Ong, S. H., & Mukerjee, R. (2010). Data-dependent probability matching priors of the second order. *Statistics*, 44(3), 291–302. <https://doi.org/10.1080/02331880903023829>
- Paszke, A., Gross, S., Massa, F., Lerer, A., Bradbury, J., Chanan, G., Killeen, T., Lin, Z., Gimelshein, N., Antiga, L., Demaison, A., Köpf, A., Yang, E., DeVito, Z., Raison, M., Tejani, A., Chilamkurthy, S., Steiner, B., Fang, L., Chintala, S. (2019). PyTorch: An imperative style, high-performance deep learning library. In *Advances in Neural Information Processing Systems 32* (pp. 8024-8035). Curran Associates, Inc. Retrieved from <http://papers.neurips.cc/paper/9015-pytorch-an-imperative-style-high-performance-deep-learning-library.pdf>.
- Polson, N. G., Scott, J. G., & Windle, J. (2013). Bayesian inference for logistic models using Pólya-Gamma latent variables. *Journal of the American Statistical Association*, 108(504), 1339–1349. <https://doi.org/10.1080/01621459.2013.829001>
- Polson, N. G., Scott, J. G., Windle, J., Oksanen, J., and Balamuta, J. (2019). BayesLogit: PolyaGamma sampling, R package version 2.1. <https://cran.r-project.org/web/packages/BayesLogit/index.html>
- Reckase, M. D. (2009). *Multidimensional item response theory*. Springer New York. <https://doi.org/10.1007/978-0-387-89976-3>

- Rezende, D. J., Mohamed, S., & Wierstra, D. (2014). Stochastic backpropagation and approximate Inference in deep generative models. In E. P. Xing & T. Jebara (Eds.), *Proceedings of the 31st International Conference on Machine Learning* (Vol. 32, Issue 2, pp. 1278–1286). PMLR. <https://proceedings.mlr.press/v32/rezende14.html>
- Ročková, V., & George, E. I. (2016). Fast Bayesian factor analysis via automatic rotations to sparsity. *Journal of the American Statistical Association*, 111(516), 1608–1622. <https://doi.org/10.1080/01621459.2015.1100620>
- Robbins, H., & Monroe, S. (1951). A stochastic approximation method. *The Annals of Mathematical Statistics*, 22(3), 400–407. <https://doi.org/10.1214/aoms/1177729586>
- Schmidt, D. and Makalic, E. (2019). pgdraw: Generate Random Samples from the Polya-Gamma Distribution. R package version 1.1. <https://cran.r-project.org/web/packages/pgdraw/index.html>
- Schofield, L. S., Junker, B., Taylor, L. J., & Black, D. A. (2015). Predictive inference using latent variables with covariates. *Psychometrika*, 80(3), 727–747. <https://doi.org/10.1007/s11336-014-9415-z>
- Schuster, C., & Yuan, K. H. (2011). Robust estimation of latent ability in item response models. *Journal of Educational and Behavioral Statistics*, 36(6), 720–735. <https://doi.org/10.3102/1076998610396890>
- Scott, J. G., & Sun, L. (2013). Expectation-maximization for logistic regression. 1, 1–25. <http://arxiv.org/abs/1306.0040>
- 芝祐順(編) (1991). 項目反応理論－基礎と応用－東京大学出版会.
- Singh, K., Xie, M., & Strawderman, W. E. (2005). Combining information from independent sources through confidence distributions. *Annals of Statistics*, 33(1), 159–183. <https://doi.org/10.1214/009053604000001084>
- Sinharay, S. (2015). The asymptotic distribution of ability estimates: Beyond dichotomous items and unidimensional IRT models. *Journal of Educational and Behavioral Statistics*, 40(5), 511–528. <https://doi.org/10.3102/1076998615606115>
- 須山敦志 (2019) . ベイズ深層学習 講談社
- 鈴木大慈 (2015) . 確率の最適化 講談社
- Tang, X., Zhang, S., Wang, Z., Liu, J., & Ying, Z. (2021). ProcData: An R package for process data analysis. *Psychometrika*. <https://doi.org/10.1007/s11336-021-09798-7>
- Tao, J., Shi, N. Z., & Chang, H. H. (2012). Item-weighted likelihood method for ability estimation in tests composed of both dichotomous and polytomous items. *Journal of Educational and Behavioral Statistics*, 37(2), 298–315. <https://doi.org/10.3102/1076998610393969>
- 豊田秀樹 (2005). 項目反応理論[理論編]－テストの数理－ 朝倉書店.
- Urban, C. J., & Bauer, D. J. (2021). A deep learning algorithm for high-dimensional exploratory item factor analysis. *Psychometrika*, 86(1), 1–29. <https://doi.org/10.1007/s11336-021-09748-3>
- Usami, S., Murayama, K., & Hamaker, E. L. (2019). A unified framework of longitudinal models to examine reciprocal relations. *Psychological Methods*, 24(5), 637–657. <http://dx.doi.org/10.1037/met0000210>
- van der Linden, W. J. (2016). *Handbook of item response theory volume one: Models*. CRC press.
- van der Linden, W. J., & Hambleton, R. K. (1997). *Handbook of modern item response theory*. Springer.
- Veronese, P., & Melilli, E. (2021). Confidence distribution for the ability parameter of the Rasch model. *Psychometrika*, 86(1), 131–166. <https://doi.org/10.1007/s11336-021-09747-4>
- von Davier, M., & von Davier, A. (2007). A unified approach to IRT scale linking and scale transformations. *Methodology*, 3(3), 115–124. <https://doi.org/10.1027/1614-2241.3.3.115>
- Xie, M. G., & Singh, K. (2013). Confidence distribution, the frequentist distribution estimator of a parameter: A review. *International Statistical Review*, 81(1), 3–39. <https://doi.org/10.1111/insr.12000>
- Xie, M., Singh, K., & Strawderman, W. E. (2011). Confidence distributions and a unifying framework for meta-analysis. *Journal of the American Statistical Association*, 106(493), 320–333. <https://doi.org/10.1198/jasa.2011.tm09803>
- Zabell, S. L. (1992). R. A. Fisher and fiducial argument. *Statistical Science*, 7(3), 15–51. <https://doi.org/10.1214/ss/1177011233>
- Zhang, H., Chen, Y., & Li, X. (2020). A note on exploratory item factor analysis by singular value decomposition. *Psychometrika*, 85(2), 358–372. <https://doi.org/10.1007/s11336-020-09704-7>
- Zhang, S., Chen, Y., and Li, X. (2020). mirtjml: Joint maximum likelihood estimation for high-Dimensional item factor analysis. R package version 1.4.0. <https://CRAN.R-project.org/package=mirtjml>
- Zhang, S., Chen, Y., & Liu, Y. (2020). An improved stochastic EM algorithm for large-scale full-information item factor analysis. *British Journal of Mathematical and Statistical Psychology*, 73(1), 44–71. <https://doi.org/10.1111/bmsp.12153>
- Zimowski, M. F., Muraki, E., Mislevy, R. J., & Bock, R. D. (1996). BILOG-MG: Multiple-group IRT analysis and test maintenance for binary items [Computer software]. Chicago: Scientific Software International.